

ISSN 2518-1726 (Online),
ISSN 1991-346X (Print)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің

Х А Б А Р Л А Р Ы

ИЗВЕСТИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Казахский национальный университет
им. аль-Фараби

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Al-Farabi Kazakh
National University

SERIES
PHYSICO-MATHEMATICAL

4 (332)

JULY – AUGUST 2020

PUBLISHED SINCE JANUARY 1963

PUBLISHED 6 TIMES A YEAR

ALMATY, NAS RK

Б а с р е д а к т о р ы
ф.-м.ғ.д., проф., ҚР ҮҒА академигі
F.M. Мұтанов

Р е д а к ц и я а л к а с ы:

Асанова А.Т. проф. (Қазақстан)
Бошқаев К.А. PhD докторы (Қазақстан)
Байгунчеков Ж.Ж. проф., академик (Қазақстан)
Вишневский И.Н. проф., академик (Украина)
Quevedo Hernando проф. (Мексика),
Жұсіпов М.А. проф. (Қазақстан)
Жұмабаев Д.С. проф. (Қазақстан)
Ковалев А.М. проф., академик (Украина)
Калимолдаев М.Н. проф., академик (Қазақстан)
Михалевич А.А. проф., академик (Белорусь)
Молдабеков М. М. проф., академик (Қазақстан)
Мырзакулов Р. проф., академик (Қазақстан)
Өмірбаев У.У. проф., академик (Қазақстан)
Пашаев А. проф., академик (Әзіrbайжан)
Рамазанов Т.С. проф., академик (Қазақстан)
Такибаев Н.Ж. проф., академик (Қазақстан), бас ред. орынбасары
Тигиняну И. проф., академик (Молдова)
Тулешов А.К. проф., чл.-корр. (Қазақстан)
Уалиев З.Г. проф., чл.-корр. (Қазақстан)

«ҚР ҮҒА Хабарлары. Физика-математикалық сериясы».

ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X (Print)

Меншіктенуші: «Қазақстан Республикасының Үлттық ғылым академиясы» РКБ (Алматы қ.).

Қазақстан Республикасының Акпарат және коммуникациялар министрлігінің Акпарат комитетінде 14.02.2018 ж. берілген № 16906-Ж мерзімдік басылым тіркеуіне қойылу туралы күелік.

Мерзімділігі: жылына 6 рет.

Тиражы: 300 дана.

Редакцияның мекенжайы: 050010, Алматы қ., Шевченко көш., 28; 219, 220 бөл.; тел.: 272-13-19; 272-13-18,
<http://physics-mathematics.kz/index.php/en/archive>

© Қазақстан Республикасының Үлттық ғылым академиясы, 2020

Типографияның мекенжайы: «NurNaz GRACE», Алматы қ., Рысқұлов көш., 103.

Г л а в н ы й р е д а к т о р
д.ф.-м.н., проф. академик НАН РК
Г.М. Мутанов

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я:

Асанова А.Т. проф. (Казахстан)
Бошхаев К.А. доктор PhD (Казахстан)
Байгунчеков Ж.Ж. проф., академик (Казахстан)
Вишневский И.Н. проф., академик (Украина)
Quevedo Hernando проф. (Мексика),
Жусупов М.А. проф. (Казахстан)
Джумабаев Д.С. проф. (Казахстан)
Ковалев А.М. проф., академик (Украина)
Калимолдаев М.Н. проф., академик (Казахстан)
Михалевич А.А. проф., академик (Беларусь)
Молдабеков М. М. проф., академик (Казахстан)
Мырзакулов Р. проф., академик (Казахстан)
Пашаев А. проф., академик (Азербайджан)
Рамазанов Т.С. проф., академик (Казахстан)
Такибаев Н.Ж. проф., академик (Казахстан), зам. гл. ред.
Тигиняну И. проф., академик (Молдова)
Тулешов А.К. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Уалиев З.Г. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Умирбаев У.У. проф., академик (Казахстан)

«Известия НАН РК. Серия физика-математическая».

ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X (Print)

Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы).

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан № 16906-Ж, выданное 14.02.2018 г.

Периодичность: 6 раз в год.

Тираж: 300 экземпляров.

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28; ком. 219, 220; тел.: 272-13-19; 272-13-18,
<http://physics-mathematics.kz/index.php/en/archive>

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2020

Адрес типографии: «NurNaz GRACE», г. Алматы, ул. Рыскулова, 103.

Editor in chief
doctor of physics and mathematics, professor, academician of NAS RK
G.M. Mutanov

Editorial board:

Asanova A.T. prof. (Kazakhstan)
Boshkayev K.A. PhD (Kazakhstan)
Baigunchekov Zh.Zh. prof., akademik (Kazakhstan)
Vishnevskyi I.N. prof., academician (Ukraine)
Quevedo Hernando prof. (Mexico),
Zhusupov M.A. prof. (Kazakhstan)
Dzhumabayev D.S. prof. (Kazakhstan)
Kovalev A.M. prof., academician (Ukraine)
Kalimoldaev M.N. prof., akademik (Kazakhstan)
Mikhalevich A.A. prof., academician (Belarus)
Moldabekov M. M. prof., akademik (Kazakhstan)
Myrzakulov R. prof., akademik (Kazakhstan)
Pashayev A. prof., academician (Azerbaijan)
Ramazanov T.S. prof., akademik (Kazakhstan)
Takibayev N.Zh. prof., academician (Kazakhstan), deputy editor in chief.
Tiginyanu I. prof., academician (Moldova)
Tuleshov A.K. prof., chl.-korr. (Kazakhstan)
Ualiev Z.G. prof., chl.-korr. (Kazakhstan)
Umirkayev U.U. prof., academician (Kazakhstan)

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Physical-mathematical series.

ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X (Print)

Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty).

The certificate of registration of a periodical printed publication in the Committee of information of the Ministry of Information and Communications of the Republic of Kazakhstan **No. 16906-Ж**, issued on 14.02.2018.

Periodicity: 6 times a year.

Circulation: 300 copies.

Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19; 272-13-18,
<http://physics-mathematics.kz/index.php/en/archive>

© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2020

Address of printing house: «NurNaz GRACE», 103, Ryskulov str, Almaty.

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

PHYSICO-MATHEMATICAL SERIES

ISSN 1991-346X

<https://doi.org/10.32014/2020.2518-1726.71>

Volume 4, Number 332 (2020), 103 – 113

UDC 517.929.4

MRNTI 27.29.17, 27.29.23

K.B. Bapaev¹, G.K. Vassilina^{1,2}, S.S. Slamzhanova³¹Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Almaty, Kazakhstan;²Almaty University of Energy and Communications, Almaty, Kazakhstan;³Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, Taldykorgan, Kazakhstan.

E-mail: bapaev41@bk.ru, v_gulmira@mail.ru, beksultan.82e@mail.ru

ON COMPRESSIBILITY AREA OF UNSTABLE DIFFERENCE-DYNAMIC SYSTEMS AND DETERMINATED CHAOS

Abstract. In this paper saddle-point bifurcation is studied. It is shown that as a result of bifurcation or collision of stable and unstable points, they leave the area. In other words, they go into chaos, i.e. in a state of disorder. Here the normalization method is used to identify the bifurcation point. Unstable in the sense of Lyapunov difference-dynamic systems are considered.

In the first part of the paper, the transformation of linear systems in instability case is given. A linear system with a diagonal matrix is considered. It is shown that in a neighborhood of zero this system is not reduced to a special form with the help of non-degenerate transformations. It is proved that for non-degenerate transformations the trajectories of a system of a special form from a neighborhood of the origin cannot be displayed in the trajectory of solutions of a given linear system. Thus, the topology of the neighborhood of the zero point of a system of a special form does not transform into the topology of a given system in a neighborhood of zero. The causes of the contradiction obtained by applying this method are shown.

In the second part, analytic difference-dynamical systems and analytic homeomorphisms are considered. Also compressive difference-dynamical systems are investigated. The concept of ω -compressing difference-dynamical systems is given. It is shown to which system the ω -compressing difference-dynamical systems are isomorphic.

Key Words: difference-dynamic system, bifurcation, stability, homeomorphism, chaos.

Introduction. The word "chaos" comes from the Greek. Initially, it meant an infinite space that existed before the appearance of everything else. Later, the Romans interpreted chaos as the original raw formless mass, into which the creator brought order and harmony. In the modern sense, chaos means a state of disorder and an irregularity of physical processes, which is called hydrodynamic and plasma turbulence.

The theory of turbulence, it would seem, should be completely based on classical macroscopic equations: Navier-Stokes equations, equations of gas dynamics, etc. However, it is not yet possible to derive the main characteristics of turbulent motion from macroscopic equations and we have to resort to additional considerations.

Until recently, the Landau hypothesis reigned supreme in the theory of the appearance of turbulence [1,2]. This theory he expressed in 1944. Similar considerations were put forward by Hopf [3] in 1948.

Landau's theory connects the emergence of turbulence with instability. This is certainly true, but how Landau's theory does this will require substantial refinement. Landau's theory indicates only one of the possible variants of the appearance of turbulence and, apparently, is far from the most important. The modern theory of bifurcations offers many other ways [3-10].

These are new ways of randomization and stochatization of fluid motion, different from those indicated by Landau.

According to Landau, the occurrence of turbulence occurs as a result of a sequential series of stability loss by the equilibrium state, by the periodic motion, by the bipolar motion and etc., as a result of which the motion becomes multi-periodic:

$$V(t) = f(w_0 t, w_1 t, \dots, w_n t),$$

here w_0, w_1, \dots, w_n are the frequencies. The function $f(\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n)$ as a function of variables $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$ is periodic for each of them with the period 2π . Ruelle and Tuckens [10] drew attention to the fact that the path indicated by Landau is not common, that the common possibility is the formation of a strange attractor [7]. But how a strange attractor arises, they have not investigated.

Statements by Yu.I. Neimark [11] on turbulence is the result of his study of homoclinic structures discovered by A. Poincaré [12].

In the description of turbulence, against the background of chaos theory, one result stands out in a special way. This is a period doubling cascade discovered by the Los Alamos physicist Mitchell Feigenbaum [6,7].

One interesting aspect of the cascade of period doubling or fork-shaped bifurcation (Feigenbaum scenario) is that when you notice it during an experiment, you will not confuse it with anything else. In addition, it is known that chaos exists beyond the cascade. Therefore, the observation of the Feigenbaum cascade in hydrodynamics is particularly convincing evidence that modes must yield to chaos.

In this paper, we study bifurcation of the “saddle point” type. And the result of a collision (bifurcation) of stable and unstable fixed points is showed, as a result of which both disappear (leave the region) i.e. this point go into chaos. The use of the normalization method to identify the bifurcation point is used for the first time for difference-dynamic systems unstable in the sense of Lyapunov [13-15].

I Transformation of linear systems in instability case

Inability to make a special appearance. Consider the linear system

$$x_{n+1} = Ax_n, \quad (x_n = x_n^1, \dots, x_n^m \in R^m).$$

Without loss of generality, we can consider diagonal matrix A and restrict ourselves to the equation for one component:

$$x_{n+1} = \lambda x_n, \quad x_n \in R^1, \quad |\lambda| > 1. \quad (1.1)$$

Using analytic mappings in a neighborhood of point $x = 0$ [4]

$$x = y + \sum_{k=2}^{\infty} a_k y^k \equiv \varphi(y); \quad y = x + \sum_{k=2}^{\infty} \alpha_k x^k \equiv \varphi^{-1}(x) \quad (1.2)$$

we transform (1.1) to the following form

$$y_{n+1} = \lambda y_n - a y_n^2. \quad (1.3)$$

We calculate the coefficients α_k of the inverse transformation $\varphi^{-1}(x)$:

$$\begin{aligned} y &= \sum_0^{\infty} y^k a_k + \alpha_2 \left(\sum_0^{\infty} y^k a_k \right)^2 + \alpha_3 \left(\sum_0^{\infty} y^k a_k \right)^3 + \dots = y + (a_2 + \alpha_2) y^2 + \\ &+ (a_3 + 2a_2 \alpha_2 + \alpha_3) y^3 + (a_4 + 3a_2 \alpha_3 + \alpha_2 (a_2^2 + 2a_3) + \alpha_4) y^4 + \dots; \\ \alpha_2 &= -a_2; \quad \alpha_3 = 2a_2^2 - a_3; \quad \alpha_4 = -a_4 - a_2 (a_2^2 + 2a_3) + 3a_2 (a_3 - 2a_2^2)_m, \dots \end{aligned}$$

From (1.3) we find ($a_2 \equiv a$)

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= \lambda y_n - a \lambda (\lambda - 1) y_n^2 + (a_3 \lambda - 2a^2 \lambda^2 + 2\lambda^3 a^2 - \lambda^3 a_3) y_n^3 + \dots, \\ a_3 \lambda - 2a^2 \lambda^2 + 2\lambda^3 a^2 - \lambda^3 a_3 &= 0. \end{aligned}$$

Therefore if $a_k \neq 0$ then (1.1) can be reduced to (1.3). If mappings (1.2) are non-degenerate in the neighborhood of a point $x = 0$, then a unique trajectory $\{x_n\}$ of equation (1.1) corresponds to any trajectory $\{y_n\}$ of equation (1.3) and vice versa.

Consider the trajectory $\{y_n\} \in (1.3)$, $y_0 = \frac{\lambda}{a}$

$$y_1 = y_0(\lambda - ay_0) = 0, y_k = 0, k \geq 1.$$

Then $x_0 = \varphi(y_0) \neq 0$, $x_1 = \lambda\varphi(y_0) = \varphi(y_1) = \varphi(0) = 0$. This is impossible.

Let $\{y_n\} \in (1.3)$ be such that $\mu_0 \leq |y_n| \leq \mu_1 n$. Then $x_0 = \varphi(y_0) \neq 0$, $x_2 = \lambda\varphi(y_0), \dots, x_{n+1} = \lambda^n\varphi(y_0)$. i.e. $x_n \rightarrow \infty$ takes place for $n \rightarrow \infty$.

Theorem 1. For non-degenerate transformations (2) trajectories $\{y_n\} \in (1.3)$ from the neighborhood $y = 0$ cannot be displayed in the trajectory $\{x_n\} \in (1)$ the neighborhood $x = 0$.

Thus, the topology of the neighborhood of $y = 0$ of the system (1.3) does not transform into the topology of the system (1) in the neighborhood $x = 0$.

The neighborhood $y = 0$ of system (1.3) is very interesting:

$$\left| \lambda - ay_n \right| < 1; \begin{cases} 0 \leq \lambda - ay_n < 1 \\ 0 \leq ay_n - \lambda < 1 \end{cases} \Rightarrow \text{stability zones};$$

$$\left| \lambda - ay_n \right| > 1; \begin{cases} \lambda - ay_n > 1 \\ ay_n - \lambda > 1 \end{cases} \Rightarrow \text{instability zones}.$$

$t_1 = \frac{\lambda - 1}{a}$, $t_2 = \frac{\lambda}{a}$, $t_3 = \frac{\lambda + 1}{a}$ are singular points of the system (1.3). As shown above, if the trajectory $\{y_n\} \in (1.3)$ falls for some "n" at a neutral singular point $t_2 = \frac{\lambda}{a}$ i.e. $t_n = \frac{\lambda}{a}$, then this trajectory goes to the point $y_n = 0 : \left\{ y_n = \frac{\lambda}{a}, y_{n+k} = 0, k \geq 1 \right\}$. There are no such trajectories in system (1.1).

Let's consider a more general case: let (1) be converted to

$$y_{n+1} = (\lambda - ay_n^{2p})y_n; z_{n+1} = (\lambda - az_n)^{2p}z_n; |y_n|^{2p} = z_n. \quad (1.4)$$

Let the transformation $x = \varphi(z)$ (1.2) transform the neighborhood $z = 0$ into a neighborhood $x = 0$ one-to-one.

Then in particular the trajectory $\{z_n \in (4)\}; z_0 = \frac{\lambda}{a}; z_k = 0, k \geq 1$ goes into the trajectory $x_0 = \phi\left(\frac{\lambda}{a}\right) \neq 0, x_1 = \lambda\phi\left(\frac{\lambda}{a}\right) = \phi(y_1) = \phi(0) = 0$. But it is impossible.

Similarly with the trajectories $\mu_0 \leq z_n \leq \mu_1 \forall n$ we have $x_0 = \phi(z_0) \neq 0, x_{n+1} = \lambda^n\phi(z_0), n > 1$. Since $\lambda > 1$ it is followed $x_n \rightarrow \infty$ for $n \rightarrow \infty$. And in this case, Theorem 1 holds.

Thus, system (1.1) in a neighborhood of a point $x = 0$ cannot be reduced to the form (1.3) or (1.4) using non-degenerate transformations (1.2).

So, the following contradiction has been obtained: on the one hand, formally (1.1) can be reduced to (1.3) (in the general case, (1.4)) by transformation (1.2), on the other hand, according to statement (1.1), this is impossible.

The reasons for the contradiction. Since we are talking about the transformation of a neighborhood of a point $x = 0$ into a neighborhood $y = 0$ (in the general case $z = 0$), it suffices to consider the transformation

$$x = y + ay^2 \equiv \phi(y); y = \frac{1}{2a}(\sqrt{1+4ax} - 1) \equiv \phi^{-1}(x); |ax| \leq 1, \quad (1.5)$$

where from $y = x - ax^2 + 2a^3x^3 + \alpha_4a^3x^4 + \dots \equiv \varphi^{-1}(x)$.

Moreover, (1) is reduced to the form

$$y_{n+1} \equiv \gamma_1 y_n + \sum_{k=3}^{\infty} \gamma_k (a\lambda)^{k-1} y_n^k; \gamma_1 = \lambda - \lambda(\lambda-1)ay_n \quad (1.6)$$

For the map (1.6) to be contracting in a neighborhood $y = 0$, it is necessary that for

$$y_{n+1} \equiv \gamma_1 y_n + \sum_{k=3}^{\infty} \gamma_k (a\lambda)^{k-1} y_n^k; \gamma_1 = \lambda - \lambda(\lambda-1)ay_n$$

inequalities

$$\omega : ay_n > 0, |\gamma_1| = \lambda |1 - (\lambda - 1)ay_n| < 1 \quad (1.7)$$

take place.

Moreover, by virtue of $|y_n| < 1$ the terms in (1.6) should be small in comparison with $\{\gamma_1 y_n\}$.

On the other hand, by virtue of (1.7), we have

- a) $0 \leq \lambda - \lambda(\lambda-1)|ay_n| < 1$;
- b) $0 \leq \lambda - \lambda(\lambda-1)|ay_n| - \lambda < 1$.

Hence we have

- a) $\{\gamma_1 y_n\}$;
- b) $\lambda|ay_n| \geq \frac{\lambda}{\lambda-1} > 1$, t.e. $(\lambda|ay_n|)^k > 1, \forall k \geq 3$.

But then in (1.6) $|\gamma_k|(|\lambda ay_n|)^{k-1} |y_n| > |\gamma_k| |y_n|$ takes place, i.e. all terms in expansion (1.6) are comparable with the first term ($\gamma_1 y_n$).

Direct study of the mapping (5). Based on (5), system (1) is transformed to

$$y_{n+1} = \frac{1}{2a}(\sqrt{1+\Delta_n} - 1), \Delta_n = 4\lambda[ay_n + a^2y_n^2]. \quad (1.8)$$

Let us find out when the map (1.8) is contracting in a neighborhood $y = 0$, i.e. inequality

$$|y_{n+1}| = \frac{1}{2|a|} \left| \sqrt{1+\Delta_n} - 1 \right| < \gamma |y_n|, \quad y_n \in \omega, \forall n >> 1 \quad (1.9)$$

holds. Let's consider all possible options:

(i) If $ay_n > 0$ then $\Delta_n \geq 0$. We will refine the estimate in (i):

$$|y_{n+1}| = \frac{2\lambda|y_n|(1+|ay_n|)}{1+\sqrt{1+\Delta_n}} < \gamma |y_n|, \gamma < 1.$$

From this inequality we find

$$2\lambda(1+z) < \gamma(1+\sqrt{1+\Delta_n}), \quad \Delta_n = 4\lambda(z+z^2), \quad z = |ay_n|. \quad (*)$$

Take $\alpha = \frac{2\lambda}{\gamma} - 1 = \frac{2\lambda - \gamma}{\gamma} > \frac{2\lambda - \lambda}{\gamma} = \frac{\lambda}{\gamma} > 1$, $a > 1$. Inequality (*) takes the form
 $(\alpha + 2\lambda z) < 1 + 4\lambda(z + z^2)$, $(\alpha^2 - 1) + 4\lambda z(\alpha - 1) + 4\lambda z^2(\lambda - 1) < 0$.

It is impossible for $\alpha = \frac{2\lambda}{\gamma} - 1 = \frac{2\lambda - \gamma}{\gamma} > \frac{2\lambda - \lambda}{\gamma} = \frac{\lambda}{\gamma} > 1$, $a > 1$, i.e.

$$|y_{n+1}| = \frac{1}{2|a|} \frac{|\Delta_n|}{1 + \sqrt{1 + |\Delta_n|}} < \lambda(|y_n| + |a|y_n^2) < \gamma|y_n|, \quad \gamma < 1$$

impossible since $\lambda > 1$.

(ii) $ay_n < 0$, $\Delta_n > 0$. Then $ay_{n+1} = \frac{1}{2}(\sqrt{1 + |\Delta_n|} - 1) > 0$, $\Delta_n > 0$, which by virtue of (i) is impossible.

(iii) $ay_n < 0$, $\Delta_n > 0$ (but certainly $1 + \Delta_n \geq 0$). Then

$$|y_{n+1}| = \frac{1}{2|a|} \left| \sqrt{1 + |\Delta_n|} - 1 \right| = \frac{|\Delta_n|}{2|a|(1 + \sqrt{1 - |\Delta_n|})} < \gamma|y_n|.$$

From the latter for $y_n \neq 0$ we have

$$\frac{|y_{n+1}|}{|y_n|} = \frac{2\lambda(1 - |ay_n|)}{1 + \sqrt{1 - |\Delta_n|}} < \gamma < 1, \text{ i.e. } \lambda(1 - |ay_n|) \leq \frac{|y_{n+1}|}{|y_n|} < \gamma < 1.$$

Thus $|y_n| \geq \alpha_0 = \frac{1}{|a|} \left(1 - \frac{\gamma}{\lambda} \right) > 0$, $\forall n \gg 1$, which contradicts the compressibility of the map.

Theorem 2. The map (1.8) is not compressive in a neighborhood $y = 0$.

II Analytic difference-dynamical systems and analytic homeomorphisms

Isomorphisms of difference-dynamical systems. Consider difference-dynamical systems on R^1

$$x_{n+1} = \lambda z_n + X(x_n); \quad X(x_n) = \sum_{k=b}^{\infty} b_k x^k, \quad (2.1)$$

Here the function $X(x_n)$ is analytic in a neighborhood of $x = 0$. We apply to (2.1) the analytic homeomorphism $x = \varphi(y)$ of a neighborhood of a point $y = 0$ [4]

$$\begin{aligned} x &= \varphi(y) \equiv y + \Phi(y); \quad \Phi = \sum_{k=z}^{\infty} a_k y^k \\ y &= \varphi^{-1}(y) \equiv x + \Psi(x); \quad \Psi(x) = \sum_{k=2}^{\infty} \alpha_k x^k, \end{aligned} \quad (2.2)$$

Here $\Phi(y)$ and $\Psi(x)$ are respectively analytic in the neighborhoods of $y = 0$ and of $x = 0$. The coefficients a_k of expansion $\Psi(x)$ are uniquely determined through a_k of $\Phi(y)$.

In the new variables, system (1) takes the form

$$y_{n+1} = \lambda y_n + \chi(y_n); \quad \chi(y) = \sum_{k=2}^{\infty} \beta_k y^k \quad (2.3)$$

Here $\chi(y)$ is analytic in a neighborhood of $y = 0$ and its coefficients β_k are uniquely determined in terms b_k of (1) and a_k of (2).

Systems (2.1) and (2.3) are called isomorphic with respect to the analytic homeomorphism (2.2) or simply isomorphic.

ω - compressive difference-dynamical systems. System (2.1) is called ω -compressive if there exists a set $\omega \subset M : |x| < \varepsilon$ on which (1) is a compressive manifold

$$|x_{n+1}| \leq \gamma |x_n|, \quad 0 < \gamma < 1; \quad x_n \in \omega, \quad \forall n \gg 1. \quad (2.4)$$

Obviously, for $|\lambda| < 1$ (stable case) system (2.1) is compressive in a neighborhood $M : |x| < \varepsilon$, i.e. $\omega = M = \{x | x| < \varepsilon\}$.

Let's highlight the next non-trivial class of unstable difference-dynamical systems ($|\lambda| > 1$)

$$x_{n+1} = (\lambda - ax_n^q)x_n + X(x_n); \quad X = x_n^{q+2} \sum_{k=0}^{\infty} b_k x_n^k, \quad q \geq 1. \quad (2.5)$$

In the neighborhood $M : |x| < \varepsilon$ we introduce the set

$$\omega = \left\{ x / |\lambda - ax^q| < 1, |x| < \varepsilon \right\}. \quad (2.6)$$

Obviously, in the unstable case ($|\lambda| > 1$), the set ω does not contain a point $x = 0$, and system (5) is ω -compressive if $\omega \neq \emptyset$.

Let for definiteness $\lambda > 0$, then $|\lambda - ax^q| < 1$:

- a) $0 \leq \lambda - ax^q < 1$;
- b) $0 \leq ax^q - \lambda < 1$.

Let's put $p \equiv \left(\frac{\lambda}{|a|} \right)^{\frac{1}{q}}$, $\underline{p} \equiv \left(\frac{\lambda-1}{|a|} \right)^{\frac{1}{q}}$, $\bar{p} \equiv \left(\frac{\lambda+1}{|a|} \right)^{\frac{1}{q}}$. If the condition

$$p \equiv \left(\frac{\lambda}{|a|} \right)^{\frac{1}{q}} < \varepsilon \quad (2.7)$$

is satisfied then

$$\omega = \underline{\omega} = \left\{ x / 0 < \underline{p} = \left(\frac{\lambda-1}{|a|} \right)^{\frac{1}{q}} \leq |x| \leq p \equiv \left(\frac{\lambda}{|a|} \right)^{\frac{1}{q}} \equiv \bar{p} < \varepsilon \right\}, \text{ here } \underline{\omega} = \emptyset.$$

If the stronger condition

$$\bar{p} = \left(\frac{\lambda+1}{|a|} \right)^{\frac{1}{q}} < \varepsilon \quad (2.8)$$

is satisfied then $\omega = \underline{\omega} \cup \bar{\omega}$, $\bar{\omega} = \{x / p \leq |x| \leq \bar{p} < \varepsilon\} \neq \emptyset$.

Thus, when one of the conditions (2.7) or (2.8) is fulfilled, the difference-dynamical system (5) is ω -compressive.

In part I it is proved that (5) is not an isomorphic to the linear system (1) in $(X(x) \equiv 0)$.

Theorem 3. If the difference-dynamical system (2.5) is ω -compressive, then it is isomorphic to the system

$$y_{n+1} = (\lambda - ay_n^p)y_n, \quad \forall p \geq 1. \quad (2.9)$$

Consider the general case of system (1) for $x_n \in R^m, m \geq 1$.

The proof is carried out in two stages. I. We prove first that (2.5) can be reduced to (2.9). For any fixed q (in this case $b \equiv a$) we apply sequentially the transformations

$$x = y + \gamma_i y^{q+i} \equiv \varphi_i(y), \quad i \geq 2 \quad (2.10)$$

We start for $i = 2$ and calculate the inverse transformation

$$\begin{aligned} y \equiv \phi_2^{-1}(x) &= x + \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k x^k = (y + \gamma_2 y^{q+2}) + \alpha_z (y + \gamma_2 y^{q+2})^2 + \dots = \\ &= y + \alpha_2 y^2 + \dots + \alpha_{q+1} y^{q+1} + (\gamma_2 + \alpha_{q+2}) y^{q+2} + \dots \end{aligned}$$

From here we find $\alpha_k = 0$, $k = 2, q+1$; $\alpha_{q+2} = -\gamma_2$. Substituting the transformations $\varphi_2(y)$ and $\varphi_2^{-1}(x)$ to (5), we get

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= x_{n+1} + \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k x_{n+1}^k = \lambda x_n - ax_n^{q+2} + X^*(x_n)^3 - \\ &- \gamma_2 (\lambda x_n - ax_n^{q+1} + X(x_n))^{q+2} = \lambda x_n - ax_n^{q+1} + (b_0 - \lambda^{q+2} \gamma_2) x_n^{q+2} + x_n^{q+3} X^*(x_n), \end{aligned}$$

$$\text{here } X^*(x_n) = \sum_{k=0}^{\infty} \beta_k^* x_n^k, \quad X^*(x_n) = \sum_{k=0}^{\infty} \beta_{k*} x_n^k.$$

So

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= \lambda (y_n + \gamma_2 y_n^{q+2}) - a (y_n + \gamma_2 y_n^{q+2})^{q+1} + (b_0 - \lambda^{q+2} \gamma_2) (y_n + \gamma_2 y_n^{q+2})^{q+2} + \\ &+ y_n^{q+3} Y(y_n) = \lambda y_n - ay_n^{q+1} + (b_0 + \gamma_2 (\lambda - \lambda^{q+2})) y_n^{q+2} + y_n^{q+3} Y(y_n). \end{aligned}$$

Assuming $\gamma_2 = -(\lambda - \lambda^{q+2})^{-1} b_0$ we get to the difference-dynamical system (2.5):

$$y_{n+1} = (\lambda - ay_n^q) y_n + y_n^{q+3} Y(y_n); \quad Y = \sum_{k=0}^{\infty} \mu_k y_n^k.$$

Applying the transformation (10) $y = z + \gamma_3 z^{q+3} \equiv \phi_3(z)$ for $i = 3$ to the last difference-dynamical system, we obtain

$$z_{n+1} = (\lambda - az_n^q) z_n + z_n^{q+4} Z(z_n)$$

and i.e. As usual, using Newton's method the convergence of this infinite process of "destroying" decomposition members in (2.5) is proved. Note that $Y(y_n)$ do not enter the growing degrees of the "large" parameter $|a| \gg 1$.

We show that the system

$$x_{n+1} = (\lambda - ax_n^q) x_n; \quad \omega(x) \neq \phi, \quad \omega = \{x | \lambda - ax^q | < 1, |x| < \varepsilon\} \quad (2.11)$$

reduced to the following system

$$y_{n+1} = (\lambda - by_n^q) y_n + y_n^{q+3} Y(y_n); \quad \omega(y) \neq \phi \quad (2.12)$$

using conversion

$$x = y + \gamma_1 y^{q+1} + \gamma_2 y^{q+2} \equiv \varphi(y).$$

Note that for existence $\varphi^{-1}(x)$ the neighborhood of a point $y = 0$ must be so small as to $|\gamma_1 y^{q+1} + \gamma_2 y^{q+2}| \leq |y| \mu$.

Consider the inverse transformation $y = x + \sum_{k=2}^{\infty} \alpha_k x^k \equiv \varphi^{-1}(x)$. As before, we make sure that $\tilde{\alpha}_k = 0$, $k = \overline{2, q}$. Then

$$\begin{aligned}\varphi^{-1}(x) &= y = x + \alpha_1 x^{q+1} + \alpha_2 x^{q+2} + \alpha_3 x^{q+3} + \dots = (y + \gamma_1 y^{q+1} + \gamma_2 y^{q+2}) + \\ &+ \alpha_1(\varphi)^{q+1} + \alpha_2(\varphi)^{q+2} + \alpha_3(\varphi)^{q+3} + \dots = y + (\gamma_1 + \alpha_1)y^{q+1} + (\gamma_2 + \alpha_2)y^{q+2} + \dots\end{aligned}$$

Hence $\alpha_k = -\gamma_k$, $k = 1, 2$ and by that $y = x + \gamma_1 x^{q+1} + \gamma_2 x^{q+2} + \dots \equiv \varphi^{-1}(x)$. Substituting $\varphi(y)$ and $\varphi^{-1}(x)$ to (2.11) we obtain

$$\begin{aligned}y_{n+1} &= (\lambda - ax_n^q)x_n - \gamma_1(\lambda - ax_n^q)^{q+1}x_n^{q+1} - \gamma_2(\lambda - ax_n^q)^{q+2}x_n^{q+2} + \dots = \\ &= \lambda x_n - (a + \gamma_1 \lambda^{q+1})x_n^{q+1} - \lambda^{q+2}\gamma_2 x_n^{q+2} + \dots = \\ &= \lambda(y_n + \gamma_1 y_n^{q+1} + \gamma_2 y_n^{q+2}) - (a + \gamma_1 \lambda^{q+1})(\varphi(y_n))^{q+1} - \gamma_2 \lambda^{q+2}(\varphi(y_n))^{q+2} + \dots = \\ &= \lambda y_n + ((\lambda - X^{q+1})\gamma_1 - a)y_n^{q+1} + (\lambda - X^{q+2})\gamma_2 y_n^{q+2} + \dots\end{aligned}$$

Assuming $\gamma_1 = (\lambda - \lambda^{q+1})^{-1}a$ and $(\lambda - \lambda^{q+2})\gamma_2 \equiv -b$ we obtain (2.12) with arbitrary b (together with arbitrary γ_2), which allows us to obtain $\omega(y) \neq \phi$, $\omega = \{y | \lambda - by^{q+1} | < 1, |y| < \delta\}$.

Note that, due to the ω -compressibility of the considered difference-dynamical systems (conditions (2.7), (2.8)), we have $|\gamma_1| \gg 1$. Similarly, the ω -compressibility conditions (2.12) lead to the relation $|\gamma_2| \gg 1$.

Therefore, when proving the convergence of decompositions, it is necessary to distinguish the growing degrees of values $p = |\lambda - ax_n^q| < 1$ и $\mu = |\lambda - ay_n^{q+1}| < 1$. The theorem is proved.

Remark. Polynomial difference-dynamical systems

$$x_{n+1} = \sum_{k=1}^{p-1} a_k x_n^k + x_n^p X_p(x_n), \quad (2.13)$$

can be considered. Here continuous function $X_p(x)$ is uniformly bounded

$$|X_p(x)| \leq M, \quad |x| < \varepsilon$$

in the neighborhood of the point $x = 0$.

System (2.13) turns into analytic if $X_p(x)$ is analytic function in the neighborhood of the point $x = 0$, i.e. the series $X_p(x) = \sum_{k=0}^x b_k x^k$ converges for $|x| < \varepsilon$.

Similarly, one can consider polynomial homeomorphisms $x = \varphi(y)$ of a neighborhood $y = 0$ into the neighborhood of $x = 0$:

$$x = y + \sum_{k=2}^{p-1} \gamma_k y^k + \Phi_p(y) \equiv \varphi(y), \quad y = x + \sum_{k=1}^{p-1} \alpha_k x^k + \chi_p(x) \equiv \varphi^{-1}(x),$$

here $\Phi_p(y)$ and $\chi_p(x)$ are continuous functions, i.e. they are uniformly bounded functions respectively in the neighborhoods of $y = 0$ and of $x = 0$.

Moreover, the need for proving the convergence of the series in the neighborhood of the points $y = 0$ and $x = 0$ disappears.

К.Б. Бапаев¹, Г.Қ. Василина^{1,2}, С.С. Сламжанова³

¹Математика және математикалық моделдеу институты, Алматы, Қазақстан;

²Алматы энергетика және байланыс университеті, Алматы, Қазақстан;

³І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған, Қазақстан

ТУРАҚТЫ ЕМЕС АЙЫРЫМДЫ-ДИНАМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ СЫҒЫМДАЛУ АЙМАҒЫ ТУРАЛЫ ЖӘНЕ ДЕТЕРМИНИСТИК ХАОС

Аннотация. Хаос теориясы белгілі бір жағдайларда хаос (динамикалық хаос, детерминистік хаос) деп аталатын құбылысқа ұшырайтын кейбір сыйықты емес динамикалық жүйелердің әрекетін сипаттайтын теория. Мұндай жүйенің өзгерісі кездейсоқ болып көрінеді, тіпті егер жүйені сипаттайтын модель детерминистік болса да.

Қазіргі мағынада, хаос дегеніміз - гидродинамикалық және плазмалық турбуленттілік деп аталатын физикалық процестердің тұрақсыздығы.

Турбуленттілік теориясы толығымен классикалық макроскопиялық тендеулерге негізделуі керек: Навье-Стокс тендеулері, газ динамикасы және т.б., дегенмен турбулентті қозғалыстың негізгі сипаттамаларын макроскопиялық тендеулерден алу әлі мүмкін емес, сондықтан қосымша ойларға жүгінуге тұра келеді.

Соңғы кезге дейін Ландау гипотезасы турбуленттіліктің пайда болу теориясында басты орынға ие болды. Ландау теориясы турбуленттіліктің пайда болуын тұрақсыздықпен байланыстырады. Бұл әрине дұрыс, бірақ оны жасау әдісі айтартылғатай жетілдіруді талап етеді. Жана көзқарастар тұрғысынан Ландау теориясы толық емес. Бұл турбуленттіліктің пайда болуының мүмкін болатын нұсқаларының тек біреуін ғана көрсетеді және, мүмкін, ең маңыздысынан алыс. Қазіргі бифуркация теориясы Ландау теориясынан басқа сүйықтықтың қозғалысын рандомизация және стохатизациялау жолынан басқа көптеген жолдарды ұсынады.

Ландаудың айтуы бойынша турбуленттіліктің пайда болуы тепе-тендік күйдің тұрақтылықты жоғалтудың дайекті тізбегі, пайда болған периодты қозғалыс, пайда болған биполярлық қозғалыс және т.б. нәтижесінде пайда болады, нәтижесінде қозғалыс көп периодты болады.

Рюэль мен Такенс Ландау көрсеткен жолдың тар емес екендігіне, ортақ мүмкіншілік - бейтаныс тартуды қалыптастыру екендігіне назар аударды. Бірақ таңғажайып тартушы қалай пайда болады, олар зерттелмеген.

Ю.И. Неймарктің турбуленттік туралы мәлімдемесі - А. Пуанкаре ашқан гомоклиническің құрылымдарды зерттеудің нәтижесі.

Лос-Аламостың физигі Митчел Фейгенбаум ашқан хаос теориясының фонындағы турбуленттіліктің ерекше әсемдігімен және маңыздылығымен ерекшеленетін бір нәтижеден көрінеді. Екі еселенген немесе шанышқы тәрізді бифуркация кезеңінің каскадының бір қызықты аспектісі - оны тәжірибе кезінде байқасаныз, сіз оны басқа ештеңемен шатастырмайсыз. Сонымен қатар, хаостың каскадтан тыс болатыны белгілі. Демек, Фейгенбаум каскадының гидродинамикада байқалуы режимдердің хаосқа түседінгінің нақты дәлелі болып табылады.

Бұл жұмыста біз ерекше нұкте бифуркациясын зерттейміз. Тұрақты және тұрақсыз нұктелердің бифуркация немесе соқтығысусы нәтижесінде олар аймақтан шығатыны көрсетілген. Басқаша айтқанда, олар хаосқа түседі, яғни қарбалас жағдайына. Мұнда бифуркация нұктесін анықтау үшін қалыпқа келтіру әдісі қолданылады. Ляпунов мағынасында тұрақсыз айрымды-динамикалық жүйелер қарастырылған.

Жұмыстың бірінші бөлімінде сыйықтық жүйелердің тұрақсыздығы жағдайында олардың түрленуі келтірілген. Диагональды матрицасы бар сыйықтық жүйе қарастырылған. Нөлдің айналасында бұл жүйе арнайы түрге азайтылмайтын түрлендірүлдердің көмегімен төмендетілмейтіндігі көрсетілген. Нерогенді емес түрлендірүлдер үшін белгілі бір сыйықтық жүйе шешімдерінің траекториясында тектік аудандардың траекториялары көрсетілмейтіндігі дәлелденген. Осылайша, арнайы форма жүйесіндегі нөлдік нұктенің аймағының топологиясы берілген жүйенің нөлдік аймағында топологиясына айналмайды. Осы әдісті қолдану арқылы алынған қайшылықтың себептері көрсетілген.

Екінші бөлімде аналитикалық айрымды-динамикалық жүйелер мен аналитикалық гомеоморфизмдер қарастырылған. Сонымен қоса айрымды-динамикалық ω – сыйымдалған жүйелер де зерттелген. ω – сыйымдалған айрымды-динамикалық жүйелер туралы түсінік берілген. ω – сыйымдалған айрымды-динамикалық жүйелерге изоморфты болып табылатыны көрсетілген.

Түйін сөздер: динамикалық-айрымдық жүйе, бифуркация, орнықтылық, гомеоморфизм, хаос.

К.Б. Бапаев¹, Г.К. Василина^{1,2}, С.С. Сламжанова³

¹Институт математики и математического моделирования, Алматы, Казахстан

²Алматинский университет энергетики и связи, Алматы, Казахстан

³Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, Талдыкорган, Казахстан

ОБ ОБЛАСТИ СЖИМАЕМОСТИ НЕУСТОЙЧИВЫХ РАЗНОСТНО-ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ХАОС

Аннотация. Теория хаоса есть теория, которая описывает поведение некоторых нелинейных динамических систем, подверженных при определённых условиях явлению, называемому хаос (динамический хаос, детерминированный хаос). Поведение такой системы кажется случайным, даже если модель, описывающая систему, является детерминированной.

В современном понимании хаос означает состояние беспорядка и нерегулярность физических процессов, которое называется гидродинамической и плазменной турбулентностью. Теория турбулентности, казалось бы, должна полностью основываться на классических макроскопических уравнениях: уравнениях Навье-Стокса, газодинамики и др., однако вывести основные характеристики турбулентного движения из макроскопических уравнений пока не представляется возможным и приходится прибегать к дополнительным соображениям. До последнего времени в теории возникновения турбулентности безраздельно господствовала гипотеза Ландау.

Теория Ландау связывает возникновение турбулентности с неустойчивостью. Это, безусловно верно, но то, как она это делает, потребует существенных уточнений. С точки зрения новых взглядов теория Ландау не полна. Она указывает лишь на один из возможных вариантов возникновения турбулентности и, по-видимому, далеко не самый важный. Современная теория бифуркаций предлагает много других путей, отличных от теории Ландау, пути хаотизации и стохастизации движения жидкости. По Ландау возникновение турбулентности происходит в результате последовательной серии потери устойчивости состоянием равновесия, возникшим периодическим движением, появившимся двояко периодическим движением и т.д., в результате чего движение становится многопериодическим.

Рюэль и Такенс обратили внимание на то, что путь, указанный Ландау, не общий, что общая возможность – это образование странного аттрактора. Но как возникает странный аттрактор, они не исследовали.

Высказывания Ю.И. Неймарка о турбулентности – результат исследования им гомоклинических структур, открытых еще А. Пуанкаре. Описание турбулентности на фоне теории хаоса, благодаря своей особой красоте и значимости, особенноенным образом выделяется один результат - каскад удвоения периода, открытый Лос-Аламосским физиком Митчеллом Фейгенбаумом.

Один интересный аспект каскада удвоения периода или вилообразной бифуркации (Сценарий Фейгенбаума) состоит в том, что когда вы заметите его в ходе эксперимента, то не спутаете ни с чем другим. Кроме того, известно, что за каскадом существует хаос. Следовательно, наблюдение каскада Фейгенбаума в гидродинамике является особенно убедительным доказательством того, что моды должны уступать хаосу.

В данной работе исследуется бифуркация типа седловой точки. Показывается, что в результате бифуркации или столкновения устойчивой и неустойчивой точек, они уходят из области. Другими словами, они переходят в хаос, т.е. в состояние беспорядка. Здесь применяется метод нормализации для выявления точки бифуркации. Рассматриваются разностно-динамические системы неустойчивые в смысле Ляпунова.

В первой части работы дается преобразование линейных систем в случае их неустойчивости. Рассматривается линейная система с диагональной матрицей. Показывается, что в окрестности нуля данная система не приводится с помощью невырожденных преобразований к специальному виду. Доказывается, что для невырожденных преобразований траектории системы специального вида из окрестности начала координат не могут отображаться в траектории решений заданной линейной системы. Таким образом, топология окрестности нулевой точки системы специального вида не преобразуется в топологию заданной системы в окрестности нуля. Показываются причины противоречия, получаемого при применении данного метода.

Во второй части рассматриваются аналитические разностно-динамические системы и аналитические гомеоморфизмы. Также исследуются ω – сжимающие разностно-динамические системы. Даётся понятие ω – сжимающих разностно-динамических систем. Показывается какой системе изоморфны ω – сжимающие разностно-динамические системы.

Ключевые слова: разностно-динамическая система, бифуркация, устойчивость, гомеоморфизм, хаос.

Information about authors.

Bapaev K.B., Doctor of Physics and Mathematics, Senior Researcher, Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Almaty, Kazakhstan, bapaev41@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7931-6985>;

Vassilina G.K., PhD, Senior Researcher, Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Senior Lecturer, Almaty University of Energy and Communications, Almaty, Kazakhstan, v_gulmira@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-2504-9620>;

Slamzhanova S.S., candidate of Physics and Mathematics, associate professor, Zhetysu State University named after I. Zhansugurov, Taldykorgan, Kazakhstan, [beksltuan.82e@mail.ru](mailto:beksultan.82e@mail.ru), <https://orcid.org/0000-0002-7059-0785>

REFERENCES

- [1] Landau L. D. On the problem of turbulence // Reports of the USSR Academy of Sciences. 1944. Vol. 44, No. 8. P. 339-342.
- [2] Landau L. D., Lifshits E. M. Hydrodynamics. Moscow, 1988.
- [3] Hopf E. A mathematical example displaying features of turbulence // Comm. Pure Appl. Math. 1948. Vol. 1. P. 303-322.
- [4] Arnol'd V.I. Small denominators and problems of stability of motion in classical and celestial mechanics // Russian Mathematical Surveys. 1963. 18(6):85. <http://dx.doi.org/10.1070/RM1963v018n06ABEH001143>.
- [5] Arnold V.I., Avets A. Ergodic problems of classical mechanics. Izhevsk, 1999. 160 pp.
- [6] Feigenbaum M. Quantitative universality for a class of non-linear transformations // J. Statist. Phys. 1978. 19, 25-52.
- [7] Feigenbaum M. The universal metric properties of nonlinear transformations // J. Stat. Phys. 1979. 21, 669.
- [8] Lorenz E.N. On the prevalence of aperiodicity in simple systems. In: Grmela M., Marsden J.E. (eds) Global Analysis // Lecture Notes in Mathematics, 1979. Vol. 755.
- [9] Manneville P., Pomeau Y. Different ways to turbulence in dissipative dynamical systems // Physica D. 1980. Vol. 1, No. 2. P. 219-226.
- [10] Ruelle D., Takens F. On the nature of turbulence // Commun Math Phys. 1971. 20, 167-192.
- [11] Neimark Yu.I. The structure of the motions of a dynamical system in the vicinity of a homoclinic curve // Proceedings of the 5th Summer Mathematical School. Kiev, 1968. P. 400-435.
- [12] Poincaré A. Selected Works. Vol. II. Moscow, 1972.
- [13] Bapaev K.B. Normalization of systems of nonlinear difference equations. KazSU, NSU. Almaty-Novosibirsk, 1995. 61 p.
- [14] Bapaev K.B., Slamzhanova S.S. On stability and bifurcation of resonant difference-dynamic system // News of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. Series physico-mathematical. 2015. № 4. P. 250-255.
- [15] Bapaev K.B., Vassilina G.K. On Lagrange stability and Poisson stability of the differential-dynamic systems // News of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. Series physico-mathematical. 2019. Vol. 5, № 327. P. 120-125. <https://doi.org/10.32014/2019.2518-1726.66>

**Publication Ethics and Publication Malpractice
in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan**

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication see <http://www.elsevier.com/publishingethics> and <http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics>.

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see <http://www.elsevier.com/postingpolicy>), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder. In particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted.

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the Cross Check originality detection service <http://www.elsevier.com/editors/plagdetect>.

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly contributed to the research.

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the research funders.

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor and safeguard publishing ethics.

(Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайтах:

www:nauka-nanrk.kz

<http://physics-mathematics.kz/index.php/en/archive>

ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X (Print)

Редакторы: *M. С. Ахметова, Д. С. Аленов, А. Ахметова*
Верстка на компьютере *А.М. Кульгинбаевой*

Подписано в печать 12.08.2020.
Формат 60x881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф.
9,25 п.л. Тираж 300. Заказ 4.

*Национальная академия наук РК
050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19*