

**ISSN 2518-1726 (Online),
ISSN 1991-346X (Print)**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ФЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің

Х А Б А Р Л А Р Ы

ИЗВЕСТИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Казахский национальный университет
им. аль-Фараби

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Al-Farabi
Kazakh National University

**SERIES
PHYSICO-MATHEMATICAL**

2 (336)

MARCH – APRIL 2021

PUBLISHED SINCE JANUARY 1963

PUBLISHED 6 TIMES A YEAR

ALMATY, NAS RK

NAS RK is pleased to announce that News of NAS RK. Series physico-mathematical journal has been accepted for indexing in the Emerging Sources Citation Index, a new edition of Web of Science. Content in this index is under consideration by Clarivate Analytics to be accepted in the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index, and the Arts & Humanities Citation Index. The quality and depth of content Web of Science offers to researchers, authors, publishers, and institutions sets it apart from other research databases. The inclusion of News of NAS RK. Series of chemistry and technologies in the Emerging Sources Citation Index demonstrates our dedication to providing the most relevant and influential content of chemical sciences to our community.

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы "ҚР ҰҒА Хабарлары. Физикалық-математикалық сериясы" ғылыми журналының Web of Science-тің жаңаланған нұсқасы Emerging Sources Citation Index-те индекстелуеге қабылданғанын хабарлайды. Бұл индекстелу барысында Clarivate Analytics компаниясы журналды одан әрі the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index және the Arts & Humanities Citation Index-ке қабылдау мәселесін қарастыруды. Web of Science зерттеушілер, авторлар, баспашилар мен мекемелерге контент тереңдігі мен сапасын ұсынады. ҚР ҰҒА Хабарлары. Химия және технология сериясы Emerging Sources Citation Index-ке енүі біздің қоғамдастық үшін ең өзекті және беделді химиялық ғылымдар бойынша контентке адалдығымызды білдіреді.

НАН РК сообщает, что научный журнал «Известия НАН РК. Серия физико-математическая» был принят для индексирования в Emerging Sources Citation Index, обновленной версии Web of Science. Содержание в этом индексировании находится в стадии рассмотрения компанией Clarivate Analytics для дальнейшего принятия журнала в the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index и the Arts & Humanities Citation Index. Web of Science предлагает качество и глубину контента для исследователей, авторов, издателей и учреждений. Включение Известия НАН РК в Emerging Sources Citation Index демонстрирует нашу приверженность к наиболее актуальному и влиятельному контенту по химическим наукам для нашего сообщества.

Бас редактор
ф.-м.ғ.д., проф., ҚР ҮҒА академигі
F.M. Мутанов

Редакция алқасы:

Асанова А.Т. проф. (Қазақстан)
Бошкаев К.А. PhD докторы (Қазақстан)
Байгунчеков Ж.Ж. проф., академик (Қазақстан)
Quevedo Hernando проф. (Мексика)
Жұсіпов М.А. проф. (Қазақстан)
Ковалев А.М. проф., академик (Украина)
Калимoldаев М.Н. проф., академик (Қазақстан)
Михалевич А.А. проф., академик (Белорусь)
Мырзакулов Р. проф., академик (Қазақстан)
Рамазанов Т.С. проф., академик (Қазақстан)
Такибаев Н.Ж. проф., академик (Қазақстан), бас ред. орынбасары
Тигиняну И. проф., академик (Молдова)
Уалиев З.Г. проф., чл.-корр. (Қазақстан)
Харин С.Н. проф., академик (Қазақстан)

«ҚР ҮҒА Хабарлары. Физика-математикалық сериясы».

ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X (Print)

Меншіктенуші: «Қазақстан Республикасының Үлттық ғылым академиясы» РКБ (Алматы қ.).
Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Ақпарат комитетінде
14.02.2018 ж. берілген № 16906-Ж мерзімдік басылым тіркеуіне қойылу туралы қуәлік.

**Тақырыптық бағыты: физика-математика ғылымдары және ақпараттық
технологиялар саласындағы басым ғылыми зерттеулерді
жариялау.**

Мерзімділігі: жылына 6 рет.

Тиражы: 300 дана.

Редакцияның мекен-жайы: 050010, Алматы қ., Шевченко көш., 28; 219 бөл.;
тел.: 272-13-19; 272-13-18

<http://physics-mathematics.kz/index.php/en/archive>

© Қазақстан Республикасының Үлттық ғылым академиясы, 2021

Типографияның мекен-жайы: «Аруна» ЖК, Алматы қ., Муратбаева көш., 75.

Г л а в н ы й р е д а к т о р
д.ф.-м.н., проф. академик НАН РК
Г.М. Мутанов

Р е д а к ц и о н на я кол л е г и я:

Асанова А.Т. проф. (Казахстан)
Бошкаев К.А. доктор PhD (Казахстан)
Байгунчеков Ж.Ж. проф., академик (Казахстан)
Quevedo Hernando проф. (Мексика)
Жусупов М.А. проф. (Казахстан)
Ковалев А.М. проф., академик (Украина)
Калимолдаев М.Н. проф., академик (Казахстан)
Михалевич А.А. проф., академик (Беларусь)
Мырзакулов Р. проф., академик (Казахстан)
Рамазанов Т.С. проф., академик (Казахстан)
Такибаев Н.Ж. проф., академик (Казахстан), зам. гл. ред.
Тигиняну И. проф., академик (Молдова)
Уалиев З.Г. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Харин С.Н. проф., академик (Қазақстан)

«Известия НАН РК. Серия физика-математическая».

ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X (Print)

Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы).

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан № 16906-Ж, выданное 14.02.2018 г.

**Тематическая направленность: публикация приоритетных научных исследований
в области физико-математических наук
и информационных технологий.**

Периодичность: 6 раз в год.

Тираж: 300 экземпляров.

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28; ком. 219; тел.: 272-13-19; 272-13-18

<http://physics-mathematics.kz/index.php/en/archive>

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2021

Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбая, 75.

Editor in chief
doctor of physics and mathematics, professor, academician of NAS RK
G.M. Mutanov

Editorial board:

Asanova A.T. prof. (Kazakhstan)
Boshkayev K.A. PhD (Kazakhstan)
Baigunchekov Zh.Zh. prof., akademik (Kazakhstan)
Quevedo Hemando prof. (Mexico)
Zhusupov M.A. prof. (Kazakhstan)
Kovalev A.M. prof., academician (Ukraine)
Kalimoldaev M.N. prof., akademik (Kazakhstan)
Mikhalevich A.A. prof., academician (Belarus)
Myrzakulov R. prof., akademik (Kazakhstan)
Ramazanov T.S. prof., akademik (Kazakhstan)
Takibayev N.Zh. prof., academician (Kazakhstan), deputy editor in chief.
Tiginyanu I. prof., academician (Moldova)
Ualiev Z.G. prof., chl.-korrr. (Kazakhstan)
Kharin S.N. prof., academician (Kazakhstan)

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Physical-mathematical series.

ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X (Print)

Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty).

The certificate of registration of a periodical printed publication in the Committee of information of the Ministry of Information and Communications of the Republic of Kazakhstan **No. 16906-Ж**, issued on 14.02.2018.

Thematic scope: publication of priority research in the field of physical and mathematical sciences and information technology.

Periodicity: 6 times a year.

Circulation: 300 copies.

Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, Almaty, 050010, tel. 272-13-19; 272-13-18

<http://physics-mathematics.kz/index.php/en/archive>

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

PHYSICO-MATHEMATICAL SERIES

ISSN 1991-346X

Volume 2, Number 336 (2021), 172 – 178

<https://doi.org/10.32014/2021.2518-1726.38>

UDC 517.951, 530.145, 539.12

MPHTI 29.05.05, 27.35.55

G. T. Bekova¹, A. A. Zhadyranova²

¹Kh. Dosmukhamedov AU, Atyrau, Kazakhstan;

²L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan.

E-mail: bekovaguldana@gmail.com, a.a.zhadyranova@gmail.com

MULTI-LINE SOLITON SOLUTIONS FOR THE TWO-DIMENSIONAL NONLINEAR HIROTA EQUATION

Abstract. At present, the question of studying multidimensional nonlinear integrable equations in the framework of the theory of solitons is very interesting to foreign and Kazakh scientists. Many physical phenomena that occur in nature can be described by nonlinearly integrated equations. Finding specific solutions to such equations plays an important role in studying the dynamics of phenomena occurring in various scientific and engineering fields, such as solid state physics, fluid mechanics, plasma physics and nonlinear optics. There are several methods for obtaining real and soliton, soliton-like solutions of such equations: the inverse scattering method, the Hirota's bilinear method, Darboux transformation methods, the tanh-coth and the sine-cosine methods. In our work, we studied the two-dimensional Hirota equation, which is a modified nonlinear Schrödinger equation. The nonlinear Hirota equation is one of the integrating equations and the Hirota system is used in the field of study of optical fiber systems, physics, telecommunications and other engineering fields to describe many nonlinear phenomena. To date, the first, second, and n-order Darboux transformations have been developed for the two-dimensional system of Hirota equations, and the soliton, rogue wave solutions have been determined by various methods.

In this article, we consider the two-dimensional nonlinear Hirota equations. Using the Lax pair and Darboux transformation we obtained the first and the second multi-line soliton solutions for this equation and provided graphical representation.

Key words. two-dimensional nonlinear Hirota equations, nonlinear integrable equations, Lax pair, Darboux transformation, multi-line soliton solutions.

Introduction. Solitons are important when considering nonlinear equations. Nonlinearly integrated systems have been hotly debated among scientists. This area has developed extensively, mainly in all areas covered by technology and science. There are several ways to obtain nonlinear soliton solutions of evolutionary equations. These include the nonlinear method of the Hirota equation, the Darboux transformation (DT), the Painleve analysis, and more [1-7].

In this paper, the two-dimensional nonlinear Hirota equation is a modified nonlinear Schrödinger equation considered. The Hirota system is used to describe many nonlinear phenomena. It is widely used in the field of study of optical fiber systems, in the mechanisms of physics, electrical communication and other engineering sciences [8, 9].

Consider the one-component two-dimensional nonlinear Hirota equation as follows [10]:

$$iq_t + \alpha q_{xy} + i\beta q_{xxy} - vq + i(\omega q)_x = 0, \quad (1)$$

$$v_x + 2\alpha\delta(|q|^2)_y - 2i\beta(q_{xy}^*q - q^*q_{xy}) = 0, \quad (2)$$

$$\omega_x - 2\beta\delta(|q|^2)_y = 0, \quad (3)$$

where $q = q(x, y, t)$ is the complex functions and $v = v(x, y, t)$, $w = w(x, y, t)$, ($i = 1, 2$) are the real functions. It is integrated by the method of the inverse scattering method, thus, for its there is a Lax representation. Its Lax representation is given in the form:

$$\psi_x = A\psi, \quad (4)$$

$$\psi_t = (2\alpha\lambda + 4\beta\lambda^2)\psi_y + B\psi. \quad (5)$$

here λ – spectral parameter, Ψ - independent function, particularly $\Psi(x, y, t; \lambda) = (\Psi_1, \Psi_2, \Psi_3)^T$. A and B matrices

$$\begin{aligned} A &= -i\lambda\sigma_3 + A_0, \\ B &= \lambda B_1 + B_0, \end{aligned} \quad (6)$$

here A_0 , B_0 and σ_3 $[2 \times 2]$ dimensional matrices:

$$\begin{aligned} A_0 &= \begin{pmatrix} 0 & q \\ -r & 0 \end{pmatrix}, \\ B_0 &= -\frac{i}{2}v\delta_3 + \begin{pmatrix} 0 & i\alpha q_y - \beta q_{xy} - \omega q \\ i\alpha r_y + \beta r_{xy} + \omega r & 0 \end{pmatrix}, \\ B_1 &= i\omega\delta_3 + 2i\beta\delta_3 A_{0y}, \\ \delta_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

Using the Lax pair above, we can construct a Darboux transformation for a two-dimensional nonlinear Hirota equation. Compatibility condition of this system:

$$A_t - B_x + [A, B] - (2\alpha\lambda + 4\beta\lambda^2)A_y = 0. \quad (7)$$

According to the above calculations, we can obtain a two-dimensional nonlinear Hirota system. The spectral parameter λ is obtained as follows:

$$\lambda_t = (2\alpha\lambda + 4\beta\lambda^2)\lambda_y.$$

In this article we will limit ourselves to the situation $\delta = +1$.

In our previous work, we have constructed the first-order Darboux transformation for the two-dimensional nonlinear Hirota equation [1].

$$\begin{aligned} q^{[1]} &= q - 2iS_{12}, \\ v^{[1]} &= v + 4i\alpha s_{11y} + 4\beta(s_{12}q_y^* + s_{12}^*q_y + 2is_{11}s_{11y} - 2is_{12}^*s_{12y}), \\ \omega^{[1]} &= \omega - 4i\beta s_{11y} = \omega + 4i\beta s_{22y}. \end{aligned} \quad (8)$$

here we define the components of the matrix S as follows:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} \lambda_1|\psi_1|^2 + \lambda_2|\psi_2|^2 & (\lambda_1 - \lambda_2)\psi_1\psi_2^* \\ (\lambda_1 - \lambda_2)\psi_1^*\psi_2 & \lambda_1|\psi_2|^2 + \lambda_2|\psi_1|^2 \end{pmatrix}, \\ \Delta &= |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2. \end{aligned}$$

Lets find further multi-line soliton solutions using this Darboux transformation.

Multi-line soliton solutions

Here in order to find one soliton solution we choose seed solution as is the $q = \omega = \nu = 0$. When solving a linear system under zero conditions, we obtain the following basic solution [11]:

$$\psi = \begin{pmatrix} e^{-i\lambda x + f(y,t)} \\ e^{i\lambda x + g(y,t)} \end{pmatrix} \quad (9)$$

here f and g - y and t periodic differential functions.

2.1 The first multi-line soliton solution

we can rewrite the equation (9) to this type:

$$\begin{aligned} f(y,t) &= i\mu y + i(2\alpha\lambda + 4\beta\lambda^2)\mu t + c, \\ g(y,t) &= -i\mu y - i(2\alpha\lambda + 4\beta\lambda^2)\mu t - c. \end{aligned}$$

we use the N-order Darboux transformation to obtain a linear colitis solution:

$$\xi_j = \begin{pmatrix} e^{\theta_j + i\chi_j} \\ e^{-\theta_j + i\chi_j} \end{pmatrix} \quad (10)$$

here

$$\theta_j + i\chi_j = -i\lambda_j x + i\mu_j y + i(2\alpha\lambda_j + 4\beta\lambda_j^2)\mu_j t + c_j,$$

where λ_j , μ_j , c_j are random real constants and $\lambda_j = b_j + id_j$, $\mu_j = m_j + in_j$, $c_j = k_j + il_j$, ($j = 2\tau - 1$, $\tau = 1, 2, \dots, N$).

$$\begin{aligned} \theta_j &= d_j x - n_j y - 2(ab_j n_j + \alpha d_j m_j + 4\beta b_j d_j m_j + 2\beta n_j b_j^2 - 2\beta n_j d_j^2)t + k_j \\ \chi_j &= -b_j x + m_j y + 2(ab_j m_j - \alpha d_j n_j - 4\beta b_j d_j n_j + 2\beta m_j b_j^2 - 2\beta m_j d_j^2)t + l_j \end{aligned}$$

$b, d, m, k, l \neq 0$, b, d, m, k, l - real constants.

Then $q^{[1]}$, $\nu^{[1]}$, $\omega^{[1]}$ we obtain a multi-line soliton solution for:

$$\begin{aligned} q^{[1]} &= 2de^{2i\chi_j} \operatorname{sech}(2\theta_1), \\ \nu^{[1]} &= 4\alpha d [\tan 2\theta_1]_y + 8i\beta d^2 ([\tan 2\theta_1]_y - e^{-2i\chi_1} \operatorname{sech} 2\theta_1^* [e^{2i\chi_1} \operatorname{sech} 2\theta_1]_y), \\ \omega^{[1]} &= 4\beta [\tan 2\theta_1]_y. \end{aligned} \quad (11)$$

here

$$(\theta_1 + i\chi_1) + (\theta_1 - i\chi_1) = 2\theta_1 = d_1 x - n_1 y + (4\beta n_1 b_1^2 - 4\beta n_1 d_1^2 - 8\beta m_1 b_1 d_1)t - 2\alpha(n_1 b_1 + m_1 d_1)t + k_1;$$

$$(\theta_1 + i\chi_1) - (\theta_1 - i\chi_1) = 2i\chi_1 = -b_1 x + m_1 y + (4\beta m_1 b_1^2 - 4\beta m_1 d_1^2 - 8\beta n_1 b_1 d_1)t + 2\alpha(m_1 b_1 - n_1 d_1)t + l_1.$$

Let's take $q^{[1]}$ as an example to analyze the distribution features of soliton, some parameters of which are affected. Using the calculated expressions, we can deduce from the equation the following physical properties of the solution (11 a): the amplitude $[2d_1]$, the wave vector $K = (K_x, K_y) = (2d_1, -2n_1)$, the frequency $\nu = [-4(d_1 - b_1) \cdot 2\alpha(n_1 b_1 + m_1 d_1)]$, the soliton direction $g = \frac{d_1}{n_1}$. From the figure it can be seen that the distribution of a linear soliton d_j depends on the change in magnitude.

To visualize the results of the first multi-line soliton solution, we construct graphs of the expressions $q^{[1]}$, $\nu^{[1]}$ and $\omega^{[1]}$ obtained with the help of Maple 2018:




Figure 1 - $\alpha, d_1, l_1 = 1, m_1 = 2, \beta = 2, b_1 = 1.3$
and $t=0$ soliton solution for $q^{[1]}$




Figure 2 - $\alpha, d_1, l_1 = 1, \beta = 2, b_1 = 1.3, m_1 = 2,$
 $k_1 = 1.5$ and $t=0$ soliton solution for $v^{[1]}$




Figure 3 - $\alpha, d_1, l_1 = 1, \beta = -2, b_1 = 1.3, m_1 = 2, n_1, k_1 = 1.5$ and $t=0$ soliton solution for $\omega^{[1]}$

We obtained first-order multi-linear soliton solutions using the Darboux transformation for the two-dimensional nonlinear Hirota equation with given seed solution conditions.

2.2 The second multi-line soliton solution

Now we obtain three two-line soliton solutions for $N = 2$.

$$q^{[2]} = \frac{2i \left(e^{\theta_1 - \theta_1^* + \theta_3 + \theta_3^*} a_1 + e^{-*(\theta_1 + \theta_1^*) - \theta_3 - \theta_3^*} a_2 + e^{-(\theta_1 + \theta_1^*) + \theta_3 - \theta_3^*} a_2 - e^{-(\theta_1 + \theta_1^*) + \theta_3 - \theta_3^*} a_2^* \right)}{\left(e^{2(\theta_1 + \theta_3)} + e^{-2(\theta_1 + \theta_3)} \right) \beta_1 + \left(e^{2(\theta_1 - \theta_3)} + e^{-2(\theta_1 - \theta_3)} \right) \beta_2 + \left(e^{-2i(\chi_1 + \chi_3)} \right) \beta_3}, \quad (12)$$

$$\begin{aligned} a_1 &= 2id_1(b_1 - id_1 - b_3 - id_3)(b_1 + id_1 - b_3 - id_3), & \beta_1 &= (b_3 - id_3 - b_1 - id_1)(b_1 + id_1 - b_3 + id_3), \\ a_2 &= 2id_3(b_3 - id_3 - b_1 - id_1)(b_3 + id_3 - b_1 - id_1), & \beta_2 &= (b_3 - id_3 - b_1 - id_1)(b_1 - id_1 - b_3 - id_3), \\ & & \beta_3 &= -2i(d_3 - d_1). \end{aligned}$$

$v^{[2]}, \omega^{[2]}$ values are considered in the same way.

$$\begin{aligned} v^{[2]} &= -4iP + 8i\beta(R - Q) \\ \omega^{[2]} &= -4i\beta \frac{\gamma_1(e^{2(\theta_1+\theta_{1y}+\theta_3+\theta_{3y})}) + \gamma_2(e^{2(\theta_1+\theta_{1y}-\theta_3-i\chi_{3y})}) + \gamma_1^2(e^{-2(\theta_1+\theta_{1y}+\theta_3+i\chi_{3y})}) + \gamma_2^2(e^{-2(\theta_1+\theta_{1y}-\theta_3-\theta_{3y})})}{\beta_1(e^{2(\theta_3+\theta_{3y}-\theta_{1y}-i\chi_{3y})}) + \beta_2(e^{2(\theta_{3y}-i\chi_{3y})})} + \\ &+ \frac{\gamma_3(e^{2i(\chi_1-\chi_3)}) + \gamma_3^2(e^{-2i(\chi_1-\chi_3)})}{\beta_3(e^{-4i(\chi_1-\chi_3)})} \end{aligned}$$

To visualize the results obtained during the calculations on the second-order multi-linear soliton, we construct graphs of the formulas $q^{[2]}$, $v^{[2]}$ and $\omega^{[2]}$ obtained with the help of Maple 2018:




Figure 4 - $d_1, n_3, l_1, m_3, k_3 = 1, k_1 = -1, d_3 = 1.2, b_3 = 3, \alpha, \beta, l_3 = 2, b_1, n_1 = 1.5,$
and $t=0$ soliton solution for $q^{[2]}$




Figure 5 - $n_1, b_1, d_1, l_1, d_3, n_3, m_3, k_3, \gamma_2 = 1, \delta_3, \beta_1 = 1, \beta, \alpha, m_1, l_3, \delta_1, \gamma_1, \beta_2 = 2, b_3, \delta_2, \gamma_3, \beta_3 = 3, k_1 = -1$ and $t=0$ soliton solution for $v^{[2]}$




Figure 6 - $n_1, n_3, k_3, \gamma_2 = 1, k_1 = -1, \beta, \alpha, m_1, l_3, \delta_1, \gamma_1, \beta_2 = 2, b_1 = 4, b_3, \delta_2, \gamma_3, \beta_3, \beta_1 = 3, m_3 = 2.5, d_1, \delta_3, l_1 = 1.5, d_3 = 1.6$ and $t=0$ soliton solution for $\omega^{[2]}$

In this section, we obtained second-order multi-linear soliton solutions for the two-dimensional nonlinear Hirota equation with initial conditions. 3 decisions were obtained by introducing certain

designations. As a result, we constructed graphs of the exact expressions to visualize the results of the second multi-line soliton solution.

Conclusions. In this article, we considered the first and second multi-line soliton solutions for two-dimensional nonlinear Hirota equations using the Lax pair and Darboux transformation. We also provided graphical representation. The obtained result is used for further research of nonlinear integrable equations when finding different soliton solutions.

Г. Т. Бекова, А. А. Жадыранова

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау, Қазақстан
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

**ЕКІ ӨЛШЕМДІ СЫЗЫҚТЫ ЕМЕС ХИРОТА ТЕНДЕУІНЕ АРНАЛҒАН
КӨП СЫЗЫҚТЫ ШЕШІМДЕР**

Аннотация. Қазіргі уақытта солитондар теориясы шеңберінде көп өлшемді сыйықты емес интегралданатын тендеулерді зерттеу мәселесі шетелдік және Қазақстандық ғалымдар үшін үлкен қызыгушылық тудырады. Табиғатта кездесетін көптеген физикалық құбылыстарды сыйықты емес интегралданатын тендеулер арқылы сипаттауга болады. Мұндай тендеулердің нақты шешімдерін табу қатты дene физикасы, сыйықтар механикасы, плазма физикасы және сыйықты емес оптика секілді түрлі ғылыми және инженерлік салаларда кездесетін құбылыстардың динамикасын зерттеуде маңызды рөл атқарады. Осындай тендеулердің нақты және солитондық, солитон тәрізді шешімдерін алудың біршама әдісі бар: кері шашырау есебі әдісі, бисызықты Хирота әдісі, Дарбу түрлендіру әдісі, кері шашырау есебі әдісі тангенс және синус-косинус әдістері сияқты көптеген әдістер ұсынылған.

Бұл жұмыста Шредингердің модификацияланған сыйықты емес тендеуі болып табылатын екі өлшемді Хирота тендеуі зерттелінді. Сыйықты емес Хирота тендеуі интегралданатын тендеудің бірі болып табылады және Хирота жүйесі көптеген сыйықты емес құбылыстарды сипаттау үшін оптикалық талышқтар жүйесінің зерттеу аймагында, физика ғылымында, электрлік байланыс және басқа да инженерлік салаларда қолданылады. Осы уақытта дейін екі өлшемді Хирота тендеулер жүйесі үшін бірінші, екінші, n-ретті Дарбу түрлендіруі құрылған және солитондық, қиратушы толқынды шешімдері әр түрлі әдістермен анықталған.

Бұл макалада екі өлшемді сыйықты емес Хирота тендеулерін қарастырамыз. Лакс жұбын және Дарбу түрлендіруін қолдана отырып, біз осы тендеуге арналған бірінші және екінші көп сыйықты солитондық шешімдер алынды және осы шешімді графикалық бейнелеу мақсатында Maple 2018 бағдарламасы көмегімен әртүрлі уақытта көп сыйықты солитондардың графиктері құрылды.

Осы макалада қолданылған әдісті басқа да сыйықты емес комплексті тендеулерді зерттеу барысында, олардың солитондық шешімдерді табу үшін пайдалануға болады. Сонымен қатар, алынған нәтижени Хирота тендеуін одан әрі зерттеу үшін колдануға болады.

Түйін сөздер. Екі өлшемді сыйықты емес Хирота тендеулері, сыйықты емес интегралданатын тендеулер, Лакс жұбы, Дарбу түрлендіруі, мульти-сыйықты солитон шешімдері.

Г. Т. Бекова, А. А. Жадыранова

Атырауский университет им. Х.Досмухamedova, Атырау, Казахстан
Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

**МУЛЬТИЛИНЕЙНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДВУМЕРНОГО
НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ХИРОТЫ**

Аннотация. В настоящее время вопрос изучения многомерных нелинейных интегрируемых уравнений в рамках теории солитонов имеет большой интерес для зарубежных и казахстанских ученых. Многие физические явления, происходящие в природе, можно описать нелинейно-интегрированными уравнениями. Нахождение конкретных решений таких уравнений играет важную роль в изучении динамики явлений, происходящих в различных областях науки и техники, таких как физика твердого тела, механика жидкости, физика плазмы и нелинейная оптика. Существует несколько методов получения реальных и солитонных, солитоноподобных решений таких уравнений: метод обратной задачи рассеяния, билинейный метод Хироты, метод преобразования Дарбу, методы тангенса и синуса-косинуса.

В данной работе изучено двумерное уравнение Хироты, которое является модифицированным нелинейным уравнением Шредингера. Нелинейное уравнение Хироты является одним из интегрирующих уравнений, а система Хироты используется в области исследования волоконно-оптических систем, физики, телекоммуникаций и других инженерных областях для описания многих нелинейных явлений. К настоящему времени разработаны преобразования Дарбу первого, второго и n -го порядка для двумерной системы уравнений Хироты, а солитонные решения в виде разрушительных волн определены различными методами.

В статье рассмотрены двумерные нелинейные уравнения Хироты. С использованием пары Лакса и преобразования Дарбу получены первое и второе мульти-линейные солитонные решения этого уравнения и для графического представления этого решения с помощью программы Maple 2018 были построены графики многолинейных солитонов в различное время.

Метод, использованный в данной статье, может быть использован для изучения других нелинейных комплексных уравнений с целью поиска их солитонных решений. Кроме того, полученный результат может быть использован для дальнейшего изучения уравнения Хироты.

Ключевые слова: двумерные нелинейные уравнения Хироты, нелинейные интегрируемые уравнения, пара Лакса, преобразование Дарбу, мультилинейные солитонные решения.

Acknowledgements

This work was supported by the Ministry of Education and Science of Kazakhstan under grants AP08052034.

Information about authors:

Bekova Guldana Tanbaykyzy, Kh. Dosmukhamedov AU, master of natural science, senior Lecturer, bekovaguldana@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7310-1185>;

Zhadyranova Aliya Amirbekovna, L.N. Gumilyov Eurasian National University, master of natural science, senior Lecturer, a.a.zhadyranova@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-1153-3438>

REFERENCES

- [1] Yesmakhanova K., Shaikova G., Bekova G., Soliton solutions of the Hirota's system // AIP Conference Proceedings. Vol.1759. 2016. P. 020147. <https://doi.org/10.1063/1.4959761>
- [2] Myrzakulov R., Nugmanova G.N.(2013) Integriruemye obobshcheniya uravneniya Landau-Lifshica // Master PO, Kazakhstan. ISBN 978-601-301-063-2 (In Russ.).
- [3] Zaharov V.E., Tahtadzhyan L.A. Ekvivalentnost' nelinejnogo uravneniya SHredingera i uravneniya ferromagnitika Gejzenberga / Teor.Mat.Fiz. Vol. 38, 1979. P. 26-34. (In Russ.).
- [4] Zhadyranova A.A. Hierarchy of WDVV associativity equations for $n=3$ and $N=2$ case when $V_0=0$ with new system a_i , b_i , c_i // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Physical-mathematical series. <https://doi.org/10.32014/2019.2518-1726.39> 4(326). 2019. P. 14–21.
- [5] Zhadyranova A.A., Myrzakul Zh.R. Soliton surface associated with the WDVV equation for $n = 3$ case // 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1391(1) 012105.
- [6] Zaharov V.E., Manakov S.V. Mnogomernye nelinejnye integriruemye sistemy i metody ikh reshenij// Zap. nauch. sem. LOMI. Vol.133. 1984. P. 77-91. (In Russ.).
- [7] Myrzakul A., Myrzakulov R. Integrable motion of two interacting curves, spin systems and the Manakov system // International Journal of Geometric Methods in Modern Physics C. Vol.14, 2017. P. 1750115. <https://doi.org/10.1142/S0219887817501158>
- [8] Nugmanova G., Myrzakul A. (2019) Integrability of the Two-layer Spin System // Geom., Integr. and Quant. Proc. Of XXth Int. Conf., Sofia. P.208-214.
- [9] Myrzakulov R., Nugmanova G., Syzdykova R. Gauge equivalence Between (2+1)-Dimensional Continuous Heisenberg Ferromagnetic Models and Nonlinear Schrodinger-Type Equations // J. Phys.A: Math and Gen. Vol.31, 1998. P. 9535-9545 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0305-4470/31/47/013>
- [10] Shaikova G., Yesmakhanova K., Bekova G. Conservation laws of the Hirota-Maxwell-Bloch system and its reductions // Journal of Physics Conference Series. Vol.936. 2017. 012098. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/936/1/012098>
- [11] Run Zhou, Hui-Qin Hao, Rong-Rong Jia. New soliton solutions for the (2+1)-dimensional Schrödinger-Maxwell-Bloch equation// Superlattices and Microstructures. V.113. 2018. P. 409-418 <https://doi.org/10.1016/j.spmi.2017.11.019>

Publication Ethics and Publication Malpractice in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication see <http://www.elsevier.com/publishingethics> and <http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics>.

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see <http://www.elsevier.com/postingpolicy>), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder. In particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted.

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the Cross Check originality detection service <http://www.elsevier.com/editors/plagdetect>.

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly contributed to the research.

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the research funders.

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor and safeguard publishing ethics.

(Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайтах:

www:nauka-nanrk.kz

<http://physics-mathematics.kz/index.php/en/archive>

ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X (Print)

Редакторы: М. С. Ахметова, Д. С. Аленов, Р.Ж. Мрзабаева
Верстка на компьютере А.М. Кульгинбаевой

Подписано в печать 15.04.2021.
Формат 60x881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф.
11,6 пл. Тираж 300. Заказ 2.