

ISSN 2518-1726 (Online),
ISSN 1991-346X (Print)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ФЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің

Х А Б А Р Л А Р Ы

ИЗВЕСТИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Казахский национальный университет
им. аль-Фараби

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Al-Farabi
Kazakh National University

SERIES
PHYSICO-MATHEMATICAL

6 (334)

NOVEMBER – DECEMBER 2020

PUBLISHED SINCE JANUARY 1963

PUBLISHED 6 TIMES A YEAR

ALMATY, NAS RK

Б а с р е д а к т о р ы
ф.-м.ғ.д., проф., ҚР ҮФА академигі
F.M. Мұтанов

Р е д а к ц и я а л қ а с ы:

Асанова А.Т. проф. (Қазақстан)
Бошкаев К.А. PhD докторы (Қазақстан)
Байгунчеков Ж.Ж. проф., академик (Қазақстан)
Вишневский И.Н. проф., академик (Украина)
Quevedo Hernando проф. (Мексика),
Жұсіпов М.А. проф. (Қазақстан)
Ковалев А.М. проф., академик (Украина)
Калимолдаев М.Н. проф., академик (Қазақстан)
Михалевич А.А. проф., академик (Белорусь)
Молдабеков М. М. проф., академик (Қазақстан)
Мырзакулов Р. проф., академик (Қазақстан)
Өмірбаев У.У. проф., академик (Қазақстан)
Пашаев А. проф., академик (Әзіrbайжан)
Рамазанов Т.С. проф., академик (Қазақстан)
Такибаев Н.Ж. проф., академик (Қазақстан), бас ред. орынбасары
Тигиняну И. проф., академик (Молдова)
Тулешов А.К. проф., чл.-корр. (Қазақстан)
Уалиев З.Г. проф., чл.-корр. (Қазақстан)

«ҚР ҮФА Хабарлары. Физика-математикалық сериясы».

ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X (Print)

Меншіктенуші: «Қазақстан Республикасының Үлттық ғылым академиясы» РКБ (Алматы қ.).

Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Ақпарат комитетінде 14.02.2018 ж. берілген № 16906-Ж мерзімдік басылым тіркеуіне қойылу туралы күелік.

Тақырыптық бағыты: *физика-математика ғылымдары және ақпараттық технологиялар саласындағы басым ғылыми зерттеулерді жариялау.*

Мерзімділігі: жылyna 6 рет.

Тиражы: 300 дана.

Редакцияның мекенжайы: 050010, Алматы қ., Шевченко көш., 28; 219, 220 бөл.; тел.: 272-13-19; 272-13-18,
<http://physics-mathematics.kz/index.php/en/archive>

© Қазақстан Республикасының Үлттық ғылым академиясы, 2020

Типографияның мекенжайы: «NurNaz GRACE», Алматы қ., Рысқұлов көш., 103.

Г л а в н ы й р е д а к т о р
д.ф.-м.н., проф. академик НАН РК
Г.М. Мутанов

Р е д а к ц и о н на я к о л л е г и я:

Асанова А.Т. проф. (Казахстан)
Бошкаев К.А. доктор PhD (Казахстан)
Байгунчеков Ж.Ж. проф., академик (Казахстан)
Вишневский И.Н. проф., академик (Украина)
Quevedo Hernando проф. (Мексика),
Жусупов М.А. проф. (Казахстан)
Ковалев А.М. проф., академик (Украина)
Калимолдаев М.Н. проф., академик (Казахстан)
Михалевич А.А. проф., академик (Беларусь)
Молдабеков М. М. проф., академик (Казахстан)
Мырзакулов Р. проф., академик (Казахстан)
Пашаев А. проф., академик (Азербайджан)
Рамазанов Т.С. проф., академик (Казахстан)
Такибаев Н.Ж. проф., академик (Казахстан), зам. гл. ред.
Тигиняну И. проф., академик (Молдова)
Тулеев А.К. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Уалиев З.Г. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Умирбаев У.У. проф., академик (Казахстан)

«Известия НАН РК. Серия физика-математическая».

ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X (Print)

Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы).

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан № 16906-Ж, выданное 14.02.2018 г.

Тематическая направленность: *публикация приоритетных научных исследований в области физико-математических наук и информационных технологий.*

Периодичность: 6 раз в год.

Тираж: 300 экземпляров.

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28; ком. 219, 220; тел.: 272-13-19; 272-13-18,
<http://physics-mathematics.kz/index.php/en/archive>

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2020

Адрес типографии: «NurNaz GRACE», г. Алматы, ул. Рыскулова, 103.

Editor in chief
doctor of physics and mathematics, professor, academician of NAS RK
G.M. Mutanov

Editorial board:

Asanova A.T. prof. (Kazakhstan)
Boshkayev K.A. PhD (Kazakhstan)
Baigunchekov Zh.Zh. prof., akademik (Kazakhstan)
Vishnevskyi I.N. prof., academician (Ukraine)
Quevedo Hernando prof. (Mexico),
Zhusupov M.A. prof. (Kazakhstan)
Kovalev A.M. prof., academician (Ukraine)
Kalimoldaev M.N. prof., akademik (Kazakhstan)
Mikhalevich A.A. prof., academician (Belarus)
Moldabekov M. M. prof., akademik (Kazakhstan)
Myrzakulov R. prof., akademik (Kazakhstan)
Pashayev A. prof., academician (Azerbaijan)
Ramazanov T.S. prof., akademik (Kazakhstan)
Takibayev N.Zh. prof., academician (Kazakhstan), deputy editor in chief.
Tiginyanu I. prof., academician (Moldova)
Tuleshov A.K. prof., chl.-corr. (Kazakhstan)
Ualiev Z.G. prof., chl.-corr. (Kazakhstan)
Umirbayev U.U. prof., academician (Kazakhstan)

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Physical-mathematical series.
ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X (Print)

Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty).
The certificate of registration of a periodical printed publication in the Committee of information of the Ministry of Information and Communications of the Republic of Kazakhstan **No. 16906-К**, issued on 14.02.2018.

Thematic scope: *publication of priority research in the field of physical and mathematical sciences and information technology.*

Periodicity: 6 times a year.

Circulation: 300 copies.

Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19; 272-13-18,
<http://physics-mathematics.kz/index.php/en/archive>

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

PHYSICO-MATHEMATICAL SERIES

ISSN 1991-346X

<https://doi.org/10.32014/2020.2518-1726.95>

Volume 6, Number 334 (2020), 36 – 44

UDC 004.9: 519.2

IRSTI 27-43-51

**M.Yu. Babich¹, M.M. Butaev¹, A.A. Tarasov¹, A.I. Ivanov²,
A.Yu. Malygin², K.T. Sauanova³, Sh.N. Sagyndykova³**

¹JSC "Scientific-Production Enterprise "Rubyn""", Penza, Russia;

²Education Center "Information Security Systems and Technologies",
Penza State University", Penza, Russia;

³Almaty University of Power Energy and Telecommunication, Almaty, Kazakhstan.

E-mail: mail @npp-rubin.ru, mal@yandex.ru, sauanova.klara@gmail.com, tomka2001@mail.ru

FUNCTIONS OF DISTRIBUTIONS OF AMOUNTS OF UNIFORMLY DISTRIBUTED RANDOM VALUES OF TIMES OF PROCESSING THE REQUEST OF THE INFOCOMMUNICATION SYSTEM

Abstract. The normal distribution of a random variable is usually used in studies of the probabilistic properties of information systems. Using the normal distribution to approximate the distributions determined over a bounded distorts the physical meaning of the model and the numerical results obtained can only be used as an initial approximation. The purpose of the work is to improve methods for calculating the probability properties of infocommunication systems. The object of study is an analytical method for calculating the request processing time in the system, the subject is the formula for calculating the duration of sequential processing of a request by elements of the system with uniformly distributed independent random processing times. For positive random variables, it is proposed to use finite-interval distribution laws, for example, beta distribution. Density formulas and probability functions for the sums of two, three, and four independent randomly distributed variables are given.

Key words: cumulative distribution function, CDF, probability density function, PDF, probabilistic properties, infocommunication system.

Introduction. In a multicriteria performance evaluation, an additive convolution of its criteria is often used; the weighting coefficients of the criteria are introduced [1]. The meaning of these weights and their values are determined heuristically, based on an expert survey. In contrast to additive convolution, a multiplicative formula is known for converting criteria efficiency functions into a general indicator with the goal of its further optimization [2]. In this case, the output of the complex criteria be more grounded and it is easier to understand. One of the approaches to deriving a multiplicative complex efficiency criterion is based on a probabilistic approach: the probabilities of reaching given criteria values are estimated. The overall probability of achieving the target values of several criteria is calculated as the product of the probabilities of the individual criteria, if criteria do not depend on each other. An increase in the probability of an individual criterion increases the likelihood of a complex criterion, therefore, increases the efficiency. At the same time, for an analytical study using a simple probabilistic multiplicative complex efficiency criterion, an analytical description of the probability distribution functions of the criteria used, which are often difficult to obtain, is necessary.

One of the important indicators of the effectiveness of infocommunication systems is the responsiveness, reactivity, throughput and other properties associated with the evaluation of the system's performance over time [3]. A probabilistic criterion, for example, the duration of data processing, is defined as the probability of completion of data processing in a given time.

Another problem to be solved at the initial stages of the design of infocommunication systems is to assess the impact of the durations of individual stages of data processing on the total processing time in the system [4, 5]. This problem is solved by the most informative calculation of probability properties durations her data processing steps.

Mathematically, the tasks of calculating the data processing time are usually solved using an acyclic directed stochastic graph. The same apparatus is used to calculate network diagrams using the PERT method [6 - 8]. Computational methods PERT designed for networks of large dimension, so the use of the central limit theorem of probability theory, justifying the use of normal probability distribution of time the law of individual stages and network as a whole [9]. Such an approach, with a small number of data processing stages in the network, causes difficulties in substantiating the use of the normal distribution law defined on the interval $(-\infty, +\infty)$. In practice a priori known minimum duration of data processing in step, it is caused by physical features of the data processing in the step, and the maximum length is determined by the requirements of the technical tasks. The mean or mode of the duration of the stage is unlikely to occur, therefore, calculation based on them has little reliability. The calculation of only the largest and smallest data processing times (interval method) is not sufficiently informative [10]. Under such conditions, it is advisable to use a probabilistic approach with a uniform density of data processing durations at the stages [11, 12].

With the sequential execution of the stages, the duration of processing requests is reduced to summing the durations of processing at each stage, i.e. to the summation of independent random variables [13 - 15]. The probability distribution function of the sum of independent random variables is calculated through the convolution formula of the distribution functions of the terms.

The topology of the connections of information processing elements in the system can be different, but to evaluate the critical duration of information processing, a sequential chain of elements is allocated that is likely to determine the temporal properties of the system. Estimating the duration of information processing in such a chain of elements, obviously, comes down to summing the processing durations in each of them. For a deeper estimation of temporal properties, it is necessary to know the probability density function (PDF) $f(t)$ and/or the cumulative distribution function (CDF) $F(t)$ of a continuous random variable [14], and the best analytical solution to this problem is an accurate analytical description of the PDF and CDF.

Mathematical model. Let random continuous independent quantities $T \in t_i, i \in 1, \dots, n$ be uniformly distributed on the intervals $t_i \in [0; \beta_i]$, $\beta_i > 0$. To simplify further analytical transformations, random variables are ordered by increasing β_i . The upper bounds of the ordered random variables are indicated by the variables b_i . Ordering condition: $b_i \leq b_{i+1}, i \in 1, \dots, n - 1$. For example, the largest values of the random component of the duration of the first stage $\beta_1 = 3$, the second stage $\beta_2 = 5$ and the third stage $\beta_3 = 4$ will receive new notation $b_1 = 3, b_2 = 4, b_3 = 5$. It is known that, due to the additive properties of the arithmetic operation of summation, changing the sequence of summing random variables does not affect the final result [13].

In contrast to [15], the simplified Heaviside function $H(t)$ [17] was used to simplify analytical dependences:

$$H(t) = \begin{cases} 0, & t < 0; \\ \text{undefined}, & t = 0; \\ 1, & 0 < t. \end{cases} \quad (1)$$

The PDF and CDF of a random variable using (1) are described:

$$f_1(t) = \begin{cases} 0, & b_1 < t < 0; \\ \frac{1}{b_1} H(b_1 - t), & 0 < t < b_1; \end{cases} \quad (2)$$

$$F_1(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0; \\ \frac{t}{b_1}, & 0 < t < b_1; \\ 1, & b_1 \leq t. \end{cases} \quad (3)$$

Based on these proposals, the formula expressions $F(t)$ and $f(t)$ are obtained for the sums of several independent random variables for a more general case than [13].

The PDF of the sum of two random variables is determined by convolution [15]:

$$f_{12}(t) = \int_0^t f_1(u) f_2(t-u) du, \quad (4)$$

where $f_1(t), f_2(t)$ are the PDF of the first and second terms; $f_{12}(t)$ is the PDF of the sum of the first and second random variables.

The CDF $F_{12}(t)$ is defined similarly. Using the direct method, $f_{12}(t)$ and $F_{12}(t)$ can be determined by substituting (2), (3) in (4):

$$f_{12}(t) = \begin{cases} 0, t \leq 0; \\ \frac{1}{b_1 b_2} [t - H(t - b_1)(t - b_1) - H(t - b_2)(t - b_2)], 0 < t < b_1 + b_2; \\ 0, b_1 + b_2 \leq t; \end{cases} \quad (5)$$

$$F_{12}(t) = \begin{cases} 0, t \leq 0; \\ \frac{1}{2b_1 b_2} [t^2 - H(t - b_1)(t - b_1)^2 - H(t - b_2)(t - b_2)^2], 0 < t < b_1 + b_2; \\ 1, b_1 + b_2 \leq t. \end{cases} \quad (6)$$

The characteristic function of the sum of two uniformly distributed random variables [17]:

$$\chi_t(p) = \frac{(1 - e^{-b_1 p})(1 - e^{-b_2 p})}{b_1 b_2 p^2}.$$

The uniformly distributed random variables and their sums are symmetric, therefore, the mean, median and mode are equal, and the asymmetry coefficient is zero. For the sum of two uniformly distributed random variables, the mode is absent [15]:

$$M(T) = M e(T) = \frac{b_1 + b_2}{2}.$$

Dissipation properties:

- variance:

$$D(T) = \frac{(b_1^2 + b_2^2)}{12};$$

- quantile of the order of 0.2:

$$\sqrt{\frac{2}{5} b_1 b_2};$$

- quantile of the order of 0.8:

$$2 \sqrt{\frac{2}{5} b_1 b_2};$$

- 2nd order starting moment :

$$m_2(T) = \frac{b_1^2 + b_2^2}{3} + \frac{b_1 b_2}{2};$$

- 3rd order starting moment :

$$m_3(T) = \frac{b_1^3 + b_2^3}{4} + \frac{b_1 b_2 (b_1 + b_2)}{2};$$

- 4th order starting moment :

$$m_4(T) = \frac{b_1^4 + b_2^4}{5} + \frac{b_1 b_2 (b_1^2 + b_2^2)}{2} + \frac{2}{3} b_1^2 b_2^2 ;$$

- kurtosis coefficient :

$$Ex(T) = \frac{9(b_1^4 + b_2^4) + 30 b_1^2 b_2^2}{5(b_1^2 + b_2^2)^2} .$$

Below, without further explanation, formulas for calculating the properties for the sums of three and four uniformly distributed random variables are given. The quantiles for such distributions are usually determined by numerical methods.

The PDF, CDF, characteristic function, mean and variance of the sum of three uniformly distributed random variables

$$f_{123}(t) = \begin{cases} 0, t \leq 0; \\ \frac{1}{2b_1 b_2 b_3} \left[t^2 - H(t - b_1)(t - b_1)^2 - H(t - b_2)(t - b_2)^2 - H(t - b_3)(t - b_3)^2 + \right. \\ \quad \left. + H(t - b_1 - b_2)(t - b_1 - b_2)^2 + H(t - b_1 - b_3)(t - b_1 - b_3)^2 + \right. \\ \quad \left. + H(t - b_2 - b_3)(t - b_2 - b_3)^2 \right], 0 < t < b_1 + b_2 + b_3; \\ 0, b_1 + b_2 + b_3 \leq t; \end{cases}$$

$$F_{123}(t) = \begin{cases} 0, t \leq 0; \\ \frac{1}{6b_1 b_2 b_3} \left[t^3 - H(t - b_1)(t - b_1)^3 - H(t - b_2)(t - b_2)^3 - H(t - b_3)(t - b_3)^3 + \right. \\ \quad \left. + H(t - b_1 - b_2)(t - b_1 - b_2)^3 + H(t - b_1 - b_3)(t - b_1 - b_3)^3 + \right. \\ \quad \left. + H(t - b_2 - b_3)(t - b_2 - b_3)^3 \right], 0 < t < b_1 + b_2 + b_3; \\ 1, b_1 + b_2 + b_3 \leq t; \end{cases}$$

$$\chi_t(p) = \frac{(1 - e^{-b_1 p})(1 - e^{-b_2 p})(1 - e^{-b_3 p})}{b_1 b_2 b_3 p^3};$$

$$M(T) = Me(T) = Mo(T) = \frac{b_1 + b_2 + b_3}{2};$$

$$D(T) = \frac{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}{12} .$$

A γ -quantile is calculated by numerically solving the equation $F_{123}(t_\gamma) = \gamma$. For example, a 0.2-quantile $t_{0.2} = 1.55675$; 0.8-quantile $t_{0.8} = 2.94325 = 4.5 - 1.55675$ with $b_1 = 1$, $b_2 = 1.5$, $b_3 = 2$. Since $F_{123}(t)$ is a polynomial interval-defined function, before solving the equation, it is necessary to determine the interval of values t_γ in which there will be a solution to the equation. Various methods can be used to determine the interval, for example, using a graph, or by tabulating $F_{123}(t)$ at the boundaries of the intervals, etc.

$$m_2(T) = \frac{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}{3} + \frac{b_1 b_2 + b_1 b_3 + b_2 b_3}{2} ;$$

$$m_3(T) = \frac{b_1^3 + b_2^3 + b_3^3}{4} + \frac{b_1 b_2 (b_1 + b_2) + b_1 b_3 (b_1 + b_3) + b_2 b_3 (b_2 + b_3)}{2} + \frac{3}{4} b_1 b_2 b_3 ;$$

$$\begin{aligned} m_4(T) &= \frac{b_1^4 + b_2^4 + b_3^4}{5} + \frac{b_1 b_2 (b_1^2 + b_2^2) + b_1 b_3 (b_1^2 + b_3^2) + b_2 b_3 (b_2^2 + b_3^2)}{2} + \\ &+ \frac{2(b_1^2 b_2^2 + b_1^2 b_3^2 + b_2^2 b_3^2)}{3} + b_1 b_2 b_3 (b_1 + b_2 + b_3); \end{aligned}$$

$$Ex(T) = \frac{9(b_1^4 + b_2^4 + b_3^4) + 30(b_1^2 b_2^2 + b_1^2 b_3^2 + b_2^2 b_3^2)}{5(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2)^2} .$$

The PDF, CDF, characteristic function, mean and variance of the sum of four uniformly distributed independent random variables:

$$f_{1234}(t) = \begin{cases} 0, t \leq 0; \\ \frac{1}{6b_1 b_2 b_3 b_4} \left[t^3 - H(t - b_1)(t - b_1)^3 - H(t - b_2)(t - b_2)^3 - H(t - b_3)(t - b_3)^3 - \right. \\ \left. - H(t - b_4)(t - b_4)^3 + H(t - b_1 - b_2)(t - b_1 - b_2)^3 + H(t - b_1 - b_3)(t - b_1 - b_3)^3 + \right. \\ \left. + H(t - b_1 - b_4)(t - b_1 - b_4)^3 + H(t - b_2 - b_3)(t - b_2 - b_3)^3 + \right. \\ \left. + H(t - b_2 - b_4)(t - b_2 - b_4)^3 + H(t - b_3 - b_4)(t - b_3 - b_4)^3 - \right. \\ \left. - H(t - b_1 - b_2 - b_3)(t - b_1 - b_2 - b_3)^3 - H(t - b_1 - b_2 - b_4)(t - b_1 - b_2 - b_4)^3 - \right. \\ \left. - H(t - b_1 - b_3 - b_4)(t - b_1 - b_3 - b_4)^3 - H(t - b_2 - b_3 - b_4)(t - b_2 - b_3 - b_4)^3 \right], \\ 0 < t < b_1 + b_2 + b_3 + b_4; \\ 0, b_1 + b_2 + b_3 + b_4 \leq t; \end{cases}$$

$$F_{1234}(t) = \begin{cases} 0, t \leq 0; \\ \frac{1}{24b_1 b_2 b_3 b_4} \left[t^4 - H(t - b_1)(t - b_1)^4 - H(t - b_2)(t - b_2)^4 - H(t - b_3)(t - b_3)^4 - \right. \\ \left. - H(t - b_4)(t - b_4)^4 + H(t - b_1 - b_2)(t - b_1 - b_2)^4 + \right. \\ \left. + H(t - b_1 - b_3)(t - b_1 - b_3)^4 + H(t - b_1 - b_4)(t - b_1 - b_4)^4 + \right. \\ \left. + H(t - b_2 - b_3)(t - b_2 - b_3)^4 + H(t - b_2 - b_4)(t - b_2 - b_4)^4 + \right. \\ \left. + H(t - b_3 - b_4)(t - b_3 - b_4)^4 - H(t - b_1 - b_2 - b_3)(t - b_1 - b_2 - b_3)^4 - \right. \\ \left. - H(t - b_1 - b_2 - b_4)(t - b_1 - b_2 - b_4)^4 - H(t - b_1 - b_3 - b_4)(t - b_1 - b_3 - b_4)^4 - \right. \\ \left. - H(t - b_2 - b_3 - b_4)(t - b_2 - b_3 - b_4)^4 \right], 0 < t < b_1 + b_2 + b_3 + b_4; \\ 1, b_1 + b_2 + b_3 + b_4 \leq t; \end{cases}$$

$$\chi_t(p) = \frac{(1 - e^{-b_1 p})(1 - e^{-b_2 p})(1 - e^{-b_3 p})(1 - e^{-b_4 p})}{b_1 b_2 b_3 b_4 p^4},$$

$$M(T) = Me(T) = Mo(T) = \frac{b_1 + b_2 + b_3 + b_4}{2},$$

$$D(T) = \frac{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 + b_4^2}{12}.$$

For example, a 0.2-quantile $t_{0.2} = 2.56716$ and a 0.8-quantile $t_{0.8} = 4.4328 = 7 - 2.56716$ with $b_1 = 1$, $b_2 = 1.5$, $b_3 = 2$, $b_4 = 2.5$.

$$\begin{aligned}
 m_2(T) &= \frac{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 + b_4^2}{3} + \frac{b_1b_2 + b_1b_3 + b_1b_4 + b_2b_3 + b_2b_4 + b_3b_4}{2}; \\
 m_3(T) &= \frac{b_1^3 + b_2^3 + b_3^3 + b_4^3}{4} + \frac{b_1b_2(b_1 + b_2) + b_1b_3(b_1 + b_3) + b_1b_4(b_1 + b_4) + b_2b_3(b_2 + b_3)}{2} + \\
 &\quad + \frac{b_2b_4(b_2 + b_4) + b_3b_4(b_3 + b_4)}{2} + \frac{3(b_1b_2b_3 + b_1b_2b_4 + b_1b_3b_4 + b_2b_3b_4)}{4}; \\
 m_4(T) &= \frac{b_1^4 + b_2^4 + b_3^4 + b_4^4}{5} + \frac{b_1b_2(b_1^2 + b_2^2) + b_1b_3(b_1^2 + b_3^2) + b_1b_4(b_1^2 + b_4^2) + b_2b_3(b_2^2 + b_3^2)}{2} + \\
 &\quad + \frac{b_2b_4(b_2^2 + b_4^2) + b_3b_4(b_3^2 + b_4^2)}{2} + \frac{2(b_1^2b_2^2 + b_1^2b_3^2 + b_1^2b_4^2 + b_2^2b_3^2 + b_2^2b_4^2 + b_3^2b_4^2)}{3} + \\
 &\quad + b_1b_2b_3(b_1 + b_2 + b_3) + b_1b_2b_4(b_1 + b_2 + b_4) + b_1b_3b_4(b_1 + b_3 + b_4) + \\
 &\quad + b_2b_3b_4(b_2 + b_3 + b_4) + \frac{3}{2}b_1b_2b_3b_4; \\
 Ex(T) &= \frac{9(b_1^4 + b_2^4 + b_3^4 + b_4^4) + 30(b_1^2b_2^2 + b_1^2b_3^2 + b_1^2b_4^2 + b_2^2b_3^2 + b_2^2b_4^2 + b_3^2b_4^2)}{5(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 + b_4^2)^2}.
 \end{aligned}$$

The proposed approach can be used to derive analytical expressions for the sum of a larger number of random variables, however, the bulkiness of the formulas increases significantly. The implementation of the proposed calculation formulas in computer programs does not cause difficulties. The temporal computational complexity is determined by the number of operations of multiplication and division when calculating the values of the functions in the last sub-interval of determining the functions of the sum of random variables. For example, for $F(t)$ with $n = 2$, the number of operations of multiplication and division is 6, for $n = 3 - 18$, and for $n = 4 - 50$, this means that the number of such operations obeys a quadratic dependence on n . Thus, the computational complexity of the formulas obtained is $O(n^2)$.

To illustrate the application of the obtained formulas, various deciles are calculated. When the probability of completion of information processing is 0.1, the duration of the information process in a chain of four elements having evenly distributed random durations in seconds at intervals [0; 15], [0; 15], [0; 15] and [0; 40] is equal to $t_{0.1} = 24.25$ s.

Risk assessments of untimely data processing are determined through decile calculations [18]. For example, to calculate the duration of processing information in the same chain at a risk level of 10%, the equation $F_{1234}(t_{0.9}) = 1 - 0.1$ is numerically solved, which implies $t_{0.9} = 60.75$ s. To calculate deciles, we used the traditional method of numerical solution of nonlinear equations.

The graphs $f_{12}(t), f_{123}(t), f_{1234}(t)$ are shown in the figure.

Summary. The obtained analytical dependences are applicable for independent random variables of the genus. The implementation of the formulas obtained in the form of computer programs allows the use of more complex distribution functions of random variables for more adequate modeling of data processing in infocommunication systems.




Figure 1- Graphs of the PDF $f_{12}(t)$, $f_{123}(t)$ and $f_{1234}(t)$ for $b_1 = 1$, $b_2 = 1.5$, $b_3 = 2$, $b_4 = 2.5$.

**М.Ю. Бабич¹, М.М. Бутаев¹, А.А. Тарасов¹, А.И. Иванов²,
А.Ю. Малыгин², К.Т. Саянова³, Ш.Н. Сагындыкова³**

¹«Рубин» ғылыми-өндірістік кәсіпорны» АҚ, Пенза, Ресей;

² Пенза мемлекеттік университеті, Пенза, Ресей;

³Алматы энергетика және байланыс университеті, Алматы, Қазақстан

ИНФОКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕНИҢ СҰРАНЫСТЫ ӨНДЕУДЕГІ БІРКЕЛКІ ҮЛЕСТИРІМДІ КЕЗДЕЙСОҚ УАҚЫТ ҚОСЫНДЫСЫНЫҢ ТАРАЛУ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Аннотация. Инфокоммуникациялық жүйелерді жобалаудың бастапқы кезеңдерінде шешілген маңызды міндеттердің бірі – деректерді өндеудің жеке кезең ұзактығының жүйеде жалпы өндеу уақытына әсерін бағалау. Бұл мәселе деректерді өндеу кезеңі ұзактығының ықтималды сипаттамаларын есептеу арқылы шешіледі.

Математикалық түрғыдан өндеу уақытын есептеу мәселесі әдетте ацикликдік бағытталған стохастикалық график арқылы шешімін табады. Аталған әдістер PERT әдісі арқылы желілік сұлбаларды есептеу үшін қолданылады. PERT есептеу әдістері ауқымды желілерге арналған, сондықтан бөлек кезеңдер мен тұтас барлық желінің орындалу уақыты үшін ықтималдық үlestірім заңдылығын қолдануды негіздейтін ықтималдық теориясының орталық шекті теоремасы қолданылады. Желідегі мәліметтерді өндеу кезеңдері аз болған жағдайда бұл тәсіл $(-\infty, +\infty)$ аралығында анықталған қалыпты тарату заңын қолдануда қызындықтар туғызады. Тәжірибеде кезеңдегі мәліметтерді өндеудің минималды ұзактығы априорлы белгілі, ол мәліметтерді өндеудің физикалық сипаттамаларына байланысты, ал максималды ұзактығы техникалық тапсырма талаптары негізінде анықталады. Кезең ұзактығының орташа мәні немесе мода ықтималдығы өте аз, сондықтан оған негізделген есептеуге деген сенім де шамалы. Ен ұзақ және қысқа өндеу уақытын есептеу (интервал әдісі) ақпаратты жеткіліксіз. Мұндай жағдайда кезеңдер бойынша деректерді өндеу уақытының біркелкі тығыздық ықтималдық әдісін қолданған жөн. Кезең бойынша дәйекті түрде орындалғанда сұранысты өндеу ұзактығы әр кезеңде өндеу уақытының қосындысы – тәуелсіз кездейсок шама қосындысы есептеледі. Тәуелсіз кездейсок шама қосындысының ықтималдылықты үlestіру функциясы мүшелердің таралу функциялары бойынша конволюция формуласы арқылы есептеледі.

Жүйедегі ақпаратты өндеу элементтерінің байланыс топологиясы әртүрлі болуы мүмкін, бірақ ақпаратты өндеудің шектік ұзактығын бағалау үшін жүйенің уақытша сипаттамасын анықтайтын тізбекті түрдегі элементтер тізбегін ерекшелейді. Осындай элементтер тізбегінде ақпаратты өндеу ұзактығын бағалау, әрине, олардың әрқайсысындағы өндеу уақытының қосындысына алынады. Уақытша сипаттамаларды теренірек бағалау үшін үздіксіз кездейсок шаманың ықтималдық тығыздығы функциясын $f(t)$ және / немесе $F(t)$ үlestірім функциясын білу қажет және бұл мәселенің ең жақсы шешімі – таралу мен тығыздық функцияларының дәл аналитикалық сипаттамасы.

Жұмыстың мақсаты – инфокоммуникациялық жүйелердің ықтималдық сипаттамаларын есептеу әдістерін жетілдіру. Зерттеу нысаны – жүйеде сұранысты өндеу уақытын есептеудің аналитикалық әдісі, тақырыбы – біркелкі бөлінген тәуелсіз кездейсок өндеу уақыты бар жүйе элементтері арқылы сұранысты ретімен

өндөу үзактығын есептеу формуласы. Екі, үш және төрт тәуелсіз біркелкі үлестірілген кездейсоқ шама қосындысы үшін тығыздық формулалары мен ықтималдықтың функциялары келтірілді.

Түйін сөздер: ықтималдық тығыздығы, үлестіру функциясы, инфокоммуникациялық жүйелердің ықтимал сипаттамасы.

**М.Ю. Бабич¹, М.М. Бутаев¹, А.А. Тарасов¹, А.И. Иванов²,
А.Ю. Малыгин², К.Т. Сауанова³, Ш.Н. Сагындыкова³**

¹АО «Научно-производственное предприятие «Рубин», Пенза, Россия;

²Пензенский Государственный Университет, Пенза, Россия;

³Алматинский Университет Энергетики и Связи, Алматы, Казахстан

ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СУММ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СЛУЧАЙНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ВРЕМЕН ОБРАБОТКИ ЗАПРОСА ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ

Аннотация. Одной из важных задач, решаемых на начальных этапах проектирования инфокоммуникационных систем является оценка влияния продолжительностей отдельных этапов обработки данных на общую продолжительность обработки в системе. Эта задача наиболее информативно решается через расчёт вероятностных характеристик длительностей этапов обработки данных. Математически задачи расчёта времени обработки данных обычно решаются с помощью ациклического направленного стохастического графа. Этот же аппарат используется для расчёта сетевых графиков методом PERT. Расчёты методы PERT созданы для сетей большой размерности, поэтому использована центральная предельная теорема теории вероятности, обосновывающая применение нормального закона распределения вероятности времени выполнения отдельных этапов и всей сети в целом. Такой подход при небольшом числе этапов обработки данных в сети вызывает сложности в обосновании использования нормального закона распределения, который определён на интервале $(-\infty, +\infty)$. На практике априорно известны минимальная продолжительность обработки данных на этапе, она обусловлена физическими особенностями обработки данных на этапе, а максимальная продолжительность определяется требованиями технического задания. Среднее значение или мода продолжительности этапа имеют место с малой вероятностью, поэтому расчёт на их основе имеет небольшую достоверность. Расчёт только наибольшего и наименьшего времени обработки данных (интервальный метод) недостаточно информативен. В таких условиях целесообразно использовать вероятностный подход с равномерной плотностью длительностей обработки данных на этапах. При последовательном выполнении этапов продолжительность обработки запросов сводится к суммированию продолжительностей обработки на каждом из этапов, т.е. к суммированию независимых случайных величин. Функция распределения вероятности суммы независимых случайных величин рассчитывается через формулу свёртки функций распределения слагаемых.

Топология соединений элементов обработки информации в системе может быть различной, но для оценки критической продолжительности обработки информации выделяют последовательную цепочку элементов, которая, вероятно, будет определять временные характеристики системы. Оценка продолжительности обработки информации в такой цепочке элементов, очевидно, сводится к суммированию продолжительностей обработки в каждом из них. Для более глубокой оценки временных характеристик необходимо знать функцию плотности вероятности $f(t)$ и/или функцию распределения $F(t)$ непрерывной случайной величины, и лучшим решением этой задачи является точное аналитическое описание функций распределения и плотности.

Цель работы – совершенствование методов расчёта вероятностных характеристик инфокоммуникационных систем. Объектом исследования является аналитический метод расчёта времени обработки запроса в системе, предметом – формулы расчёта продолжительности последовательной обработки запроса элементами системы с равномерно распределёнными независимыми случайными временами обработки. Приведены формулы плотности и функции вероятности для сумм двух, трёх и четырёх независимых равномерно распределённых случайных величин.

Ключевые слова: плотность вероятности, функция распределения, вероятностные характеристики инфокоммуникационных систем.

Information about the authors:

Babich M. Doctor of Technical Sciences, associate professor, JSC "Scientific-Production Enterprise "Rubyn"" , Penza, Russia, mail@npp-rubin.ru. <https://orcid.org/0000-0003-2969-1055>;

Butaev M.M. Doctor of Technical Sciences, professor, JSC "Scientific-Production Enterprise "Rubyn"" , Penza, Russia, mail@npp-rubin.ru. <https://orcid.org/0000-0001-6421-0048>;

Tarasov A.A. Candidate of Technical Sciences, JSC "Scientific-Production Enterprise "Rubyn" ", Penza, Russia, mail@npp-rubin.ru. <https://orcid.org/00000-0001-7028-836X>;

Ivanov A.I. Doctor of Technical Science, associate professor, Penza State University, Penza, Russia, bio.ivan.penza@mail.ru. <https://orcid.org/0000-0003-3475-2182>;

Malygin A.Yu., Doctor of Technical Sciences, professor, Penza State University, Penza, Russia, mal@yandex.ru. <https://orcid.org/0000-0002-1410-7269>;

Sauanova K.T. Candidate of Technical Sciences, AUPET, Almaty, Kazakhstan. e-mail:sauanovaklara@gmail.com. <http://orcid.org/0000-0001-8484-5446>;

Sagyndykova Sh.N Candidate of Technical Sciences, AUPET, Almaty, Kazakhstan, tomka2001@mail.ru. <http://orcid.org/0000-0001-5909-584X>

REFERENCES

- [1] Ralph L. Keeney, Howard Raiffa (1993) Decisions with Multiple Objectives:Preferences and Value. Cambridge University press. ISBN: 0-521-43883-7 (in Eng.).
- [2] Green J.M, Johnson B.W. (2002) Towards a Theory of Measures of Effectiveness.Dubley Knox Library. Monterey California. <https://www.nps.edu/library>.
- [3] Kleinrock L. (1964) Queuing systems: vol. 1 - Theory. Wiley Interscience, New York. ISBN: 978-0471491101.
- [4] Sovetov B.Ya., Yakovlev S.A.(2013) Modeling systems [Modelirovaniye sistem]. Moskva:YUrajt. ISBN: 978-5-9916-26989 (in Russ.)
- [5] Roy N., Dubey A., A. Gokhale, Dowdy L. A (2011) Capacity Planning Process for Performance Assurance of Component Based Distributed Systems. ICPE'11 - Second Joint WOSP/SIPEW International Conference on Performance Engineering, Karlsruhe, Germany, 39(3):259-270. DOI: 10.1145/1958746.1958784.
- [6] Golenko-Ginzburg D.I. (2010) Stochastic Network Models for Development Planning and Management: Monograph. Voronezh : "Scientific Book ". ISBN 978-5-98222-646-4
- [7] Weng- Ming Chu, Koan-Yuh Chang, Chien -Yu Lu, Chang-Hung Hsu, Chien -Hung Liu, Yung-Chia Hsiao. (2014) The New Approach to A the Determine the Critical Stochastic has the Path in the Activity the Network. Mathematical Problems in Engineering 2014(3):1123-1128. International Symposium on Computer, Consumer and Control (IS3C). DOI: 10.1109 / IS3C.2014.292 2014.292.
- [8] Leemis LM, Duggan M.J, Drew J.H, Mallozzi J.A, Connell K.W. (2006) Algorithms to Calculate the Distribution of the Longest Path Length of a Stochastic Activity Network with Continuous Activity Durations. Networks. 48 (3): 143-165. DOI: 10.1002/net.20125.
- [9] HOU Zhen-ting, ZHANG Xuan, KONG Xiang- xing.(2010) A new analytical algorithm for computing probability distribution of project completion time. Journal of Central South University of Technology: 1006-1010. DOI: 10.1007 / s11771-010-0591-4.
- [10] Dubois D., Fargie, H., Fortin J. (2005) Computational methods for determining the latest starting times and floats of tasks in interval-valued activity networks Journal of Intelligent Manufacturing 16(4):407-421. DOI: 10.1007/s10845-005-1654-5.
- [11] Abdelkader Y.H, Al-Ohali M. (2013) Estimating the Completion time of Stochastic Activity networks with uniform distributed activity Times Archives Des Sciences Journal Vol 66(4):115-134. https://www.researchgate.net/publication/236135085_Estimating_the_Completion_time_of_Stochastic_Activity_networks_with_uniform_distributed_activity_Times.
- [12] Sireesha V., Ravi Shankar N. (2011) Analysis of time estimates on right skewed distribution of activity times in PERT // Journal of Statistics and Mathematics. V. 2, Issue 1:15-22. <http://www.bioinfo.in/contents.php?id=85>
- [13] Feller V. (1971) Introduction to probability theory and its applications. V. 2. ISBN: 978-0-471-25709-7.
- [14] Vadzinsky R. N. (2001) Handbook of probability distributions. St. Petersburg Science. ISBN: 5-02-024919-X.
- [15] Kendall M. Stuart A. (2006) Advanced Theory of Statistics. Distribution Theory. Journal of the American Statistical Association. DOI: 10.2307 / 27639788.
- [16] Butaev M.M., Tarasov A.A. (2018) An analytical estimate of the processing time of a request by an information system. Radio electronics issues.V 12. : 69-73.(in Russ.).
- [17] Korn G., Korn T. (2010) Mathematical Handbook for Scientists and Engineers: Definitions, Theorems, and Formulas for Reference and Review.Dover Publications, Inc, Mineola, New York. ISBN:0-486-41147-8.
- [18] Udoumoh E.F., Ebong D.W. (2017) A Review of Activity Time Distributions in Risk Analysis American Journal of Operations Research 07(06):356-371. DOI: 10.4236/ajor.2017.76027.

**Publication Ethics and Publication Malpractice
in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan**

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication see <http://www.elsevier.com/publishingethics> and <http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics>.

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see <http://www.elsevier.com/postingpolicy>), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder. In particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted.

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the Cross Check originality detection service <http://www.elsevier.com/editors/plagdetect>.

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly contributed to the research.

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the research funders.

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor and safeguard publishing ethics.

(Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайтах:

www:nauka-nanrk.kz

<http://physics-mathematics.kz/index.php/en/archive>

ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X (Print)

Редакторы: *M. С. Ахметова, Д. С. Аленов, А. Ахметова*
Верстка на компьютере *A.M. Кульгинбаевой*

Подписано в печать 07.12.2020.
Формат 60x881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф.
п.л. Тираж 300. Заказ 6.